



Trabalhos Científicos

Título: Manifestações De Alergia De Início Imediato, Às Proteínas Do Leite De Vaca , Em Crianças Em Aleitamento Materno Exclusivo: Relato De Dois Casos

Autores: ROBERTA PARANHOS FRAGOSO; MARISA BURICHE LIBERATO

Resumo: INTRODUÇÃO: A PREVALÊNCIA DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV) EM LACTENTES EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO É DE CERCA DE 0,5% E AS MANIFESTAÇÕES IMEDIATAS SÃO RARAS. OBJETIVO: RELATAR DOIS CASOS DE APLV EM LACTENTES EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO, COM MANIFESTAÇÕES IMEDIATAS. 1º CASO. YSP, F, 2MESES DE VIDA, EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO, APRESENTOU LESÕES URTICARIFORMES APÓS A MAMADA , NECESSITANDO ANTIHISTAMÍNICO. AOS CINCO MESES, AINDA EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO, INICIOU CIANOSE, TOSSE, ROUQUIDÃO, DURANTE O ALEITAMENTO, COINCIDINDO COM A INGESTÃO DE LEITE DE VACA PELA MÃE, QUE O CONSUMIA EVENTUALMENTE, NECESSITANDO ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO.. EVOLUIU COM SANGUE NAS FEZES. IMNUNOGLOBULINAS IgE ESPECÍFICAS PARA LEITE DE VACA ELEVADAS. INSTITUÍDO DIETA DE EXCLUSÃO NA MÃE COM RESOLUÇÃO DO QUADRO. TRANSGRESSÃO DA DIETA MATERNA RESULTOU EM RECIDIVA DOS SINTOMAS. 2º CASO JPF, M, ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO, APRESENTOU AOS 3 MESES DE IDADE HIPEREMIA E EDEMA EM PÁLPEBRAS, PLACAS DE URTICÁRIA NO TRONCO E MEMBROS HIPEREMIA PERI ANAL APÓS A MÃE TER INGERIDO DERIVADO DE LEITE DE VACA, QUE NÃO ESTAVA FAZENDO USO DESDE O NASCIMENTO DO PRIMEIRO FILHO QUE TEVE DIAGNÓSTICO DE PROCTITE ALÉRGICA. O QUADRO SE REPETIU 1 SEMANA APÓS QUANDO NOVAMENTE A MÃE INGERIU LEITE DE VACA. DISCUSSÃO:AS MANIFESTAÇÕES ALÉRGICAS IMEDIATAS À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA SÃO RARAMENTE DESCRITAS EM CRIANÇAS EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO. HÁ RELATOS DE CASOS NA LITERATURA DE LACTENTES SENSIBILIZADOS VIA LEITE MATERNO, CUJAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS INICIAIS DE ALERGIA SURGEM APENAS APÓS O CONSUMO DO LEITE DE VACA PELA CRIANÇA. CONCLUSÃO: AVALIAÇÃO CRITERIOSA DESSES CASOS É NECESSÁRIA PELO RISCO DE ANAFLAXIA.