



Trabalhos Científicos

Título: Cisto De Colédoco No Período Neonatal

Autores: LUISA MARIA DE MORAIS HOLANDA; ADOLFO BATISTA DE SOUSA MOREIRA; MARLONN DE OLIVEIRA GOMES FILHO

Resumo: Introdução: O Cisto de colédoco é uma malformação congênita, com incidência de 1: 150.000 de nascimentos, com frequência três vezes superior no sexo feminino. Relato do caso: A.L.G.F.M, 26 dias de vida, sexo feminino, branca, em aleitamento materno exclusivo, apresentando acolia fecal desde o nascimento associada a icterícia. Ao exame físico: nutrida, icterica 3+/4+, afebril, com massa palpável em hipocôndrio direito. Sorologias para sífilis, toxoplasmose e citomegalovírus não reagentes; triagem para hipotireoidismo, deficiência de G6PD, hemoglobinopatias, fenilcetonúria, hiperplasia congênita de adrenal e fibrose cística negativas; bilirrubina total de 17,8 mg/dL e direta de 10,9 mg/dL; TGO 341 U/l e TGP de 261 U/l. US de abdome evidenciou dilatação cística das vias biliares medindo 4.9 x 4.0 cm. Foi indicado tratamento cirúrgico, sendo realizado uma hepaticojunostomia em Y-Roux associada à ressecção do cisto. Recebeu alta no 10º dia de pós-operatório, com melhora do estado geral, ativa, aceitando bem a alimentação. Discussão: O cisto de colédoco é resultado da junção anômala do ducto biliar comum e ducto pancreático principal, com refluxo do suco pancreático para via biliar comum gerando o enfraquecimento da sua parede e consequente dilatação. No período neonatal os principais sintomas são: acolia fecal, hepatomegalia e icterícia. As consequências de um cisto de colédoco não tratado precocemente podem ser: pancreatite, colangite, hipertensão portal, cirrose biliar, colangiocarcinoma, formação de cálculos nos cistos e risco de obstrução biliar. O diagnóstico é facilmente estabelecido pelo ultra-som abdominal, inclusive intra-útero, possibilitando o diagnóstico e a correção cirúrgica precoces e, conseqüentemente, a melhora do prognóstico. Conclusão: Enfim, Trata-se de uma malformação rara, havendo necessidade de se reconhecer suas manifestações para diagnóstico e tratamento precoce, diminuindo assim as complicações.