



Trabalhos Científicos

Título: Associação Entre Tipo De Parto E Constipação Intestinal Aos Seis Meses De Idade

Autores: FLAVIA LIMA DE CARVALHO; GRACIETE OLIVEIRA VIEIRA

Resumo: A literatura aponta que a construção da microbiota intestinal é influenciada pelo tipo de parto, que favorece a colonização intestinal por cepas de bactérias diferentes. O objetivo desse trabalho foi avaliar a associação entre o tipo de parto e a manifestação clínica da constipação intestinal aos seis meses de idade. Trata-se de uma análise transversal de uma coorte de base populacional, com seguimento de 1134 duplas mãe - filho. A variável dependente foi constipação intestinal. A constipação intestinal foi avaliada através da impressão materna. A variável independente foi tipo de parto (cesáreo/ vaginal). As co-variáveis foram: sexo; idade da mãe; paridade; ensino; emprego; raça. A população do estudo foi composta por 1134 crianças de seis meses de idade, dessas crianças 4,6 % eram prematuras. Dos nascidos a maioria eram do sexo masculino. Referente as características maternas, nota-se nesse estudo que houve predomínio de partos vaginais (54,9%), a maioria das mães eram primíparas (50,8%), tinham idade maior ou igual que 20 anos (81%), 36,7% estudaram até o ensino fundamental, 73,8% não trabalhavam, e 82,1% referiam ser de etnia pretas ou parda. Na análise bivariada não encontrou-se associação estatisticamente significativa. Na regressão de Poisson, encontrou se que parto cesáreo foi fator de risco para constipação intestinal (RP=1.02; p=0,900). A prevalência de constipação intestinal funcional encontrada foi dentro da faixa evidenciada em alguns estudos e o parto cesáreo fator de risco conforme descrita na literatura.