



Trabalhos Científicos

Título: Prevalência De Constipação Intestinal Aos Seis Meses De Idade

Autores: FLAVIA LIMA DE CARVALHO; GRACIETE OLIVEIRA VIEIRA

Resumo: Constipação intestinal funcional é um problema frequente na infância e sua etiopatogenia é multifatorial. O objetivo desse trabalho foi estimar a prevalência e identificar os fatores associados a constipação intestinal em crianças aos seis meses de idade. Trata-se de uma análise transversal de uma coorte de base populacional, com seguimento de 1134 duplas mãe - filho. A variável dependente foi constipação intestinal, definida segundo o relato materno de intestino preso. As variáveis foram sobre os hábitos alimentares: aleitamento materno; consumo de água; consumo de suco; consumo de alimentos amassados; consumo de alimentos peneirados; consumo de alimentos liquidificados. Os dados foram analisados usando o programa STATA versão 12.0. Foi utilizado teste de qui-quadrado de Pearson, Razão de Prevalência, regressão de Poisson. Nível de significância estatística $p < 0,05$. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas, CAAE- 49106715.8.0000.0053. A prevalência de constipação intestinal funcional encontrada foi de 12,3%, com prevalência maior no sexo masculino. Na população de estudo, 74% das crianças estavam sendo amamentadas aos 6 meses. Em relação as crianças que bebiam água, 87,5% não estavam constipadas. O suco estava presente na dieta de 84,9% das crianças, e 12,9% delas estavam constipadas. Das crianças que consumiam papas salgadas e de frutas, 12% tinham resultado positivo. Quanto a consistência, 68,1% das crianças desse trabalho recebiam os alimentos amassados, 12,7% peneirados e 47,8% liquidificados. Os resultados das análises bivariadas, houve significância estatística para a variável alimentos liquidificados ($p = 0,006$). Os resultados da análise multivariada demonstrou que o fator de risco encontrado foi alimentos liquidificados (RP=1,59; $p = 0,012$). A prevalência de constipação intestinal funcional encontrada foi dentro da faixa evidenciada em alguns estudos. E o fator associado a constipação intestinal foi alimentos liquidificados.