



Trabalhos Científicos

Título: Tricobezoar Como Causa De Dor Abdominal Na Infância.

Autores: MARIA DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA MOREIRA; LUISA MARIA DE MORAIS HOLANDA; ALYSSON FIGUEREDO DE BRITO; ANDREA LIMA FRANCO BARBOSA; LARA CHAIB RODRIGUES DE SOUZA; IRAMAIA DE ALENCAR COSTA; ANTONIO DA SILVA MACEDO ; GEORGE FRED SOARES DE MACEDO

Resumo: Introdução: Tricofagia é o ato de mastigar e engolir cabelos. Tricobezoares são aglomerado de cabelos ingeridos, afetando mais comumente o estômago e o duodeno, podendo causar dor abdominal e complicações como obstruções, perfurações, ulcerações e sangramentos. Relato do Caso: R.M.S., 6 anos e 5 meses, sexo feminino, procedente de Olho D'água das Cunhãs-MA, foi admitida no ambulatório de gastropediatria com queixa de dor epigástrica há mais de 2 meses, associada a vômitos e distensão abdominal com duas internações anteriores. Hábito intestinal normal. Alimentação adequada. Exame do abdome com hipertimpanismo, palpação dolorosa em região epigástrica e ausência de massas ou visceromegalias. Exames laboratoriais sem alterações. Ultrassonografia abdominal revelou imagens indefinidas de massa em região epigástrica e hipocôndrio esquerdo. TC abdominal demonstrou imagem densa na cavidade do estômago, sem outras alterações. Solicitado Endoscopia Digestiva Alta que evidenciou tricobezoar em corpo gástrico medindo 8,0 x 3,0 cm e gastrite erosiva em antro. Discussão: A história de tricofagia com início na infância é obtida em 50% dos pacientes com tricobezoar. Os cabelos são retidos pelas dobras da mucosa gástrica e a massa adquire consistência com os fluidos da dieta e o muco gástrico. Eles apresentam odor fétido pela decomposição dos alimentos e coloração negra pela desnaturação proteica dos fios. A paciente desse relato se enquadrava nessas considerações. Quando a mãe foi questionada sobre tricotilomania relatou que a criança sempre comia cabelos entre 3 e 5 anos de idade, não apresentando mais áreas de perdas de cabelo no momento do exame, dificultando o diagnóstico. Conclusão: Os tricobezoares, ainda que raros, são uma causa possível de vômitos, dor e massa abdominal, comportando importante morbidade física e psicológica. O seu diagnóstico requer um elevado nível de suspeição e uma anamnese cuidadosa.