



## Trabalhos Científicos

**Título:** Artralgia Com Parada De Ambulação Em Doença Inflamatória Intestinal

**Autores:** SANDY NATASCHA; ELIZETE APARECIDA LOMAZI; JULIANA CORRÊA; GABRIELA DE SOUZA GOMEZ; FLÁVIA JUSTO; MARIA ANGELA BELLOMO-BRANDÃO

**Resumo:** **INTRODUÇÃO:** As manifestações articulares constituem a forma mais comum de acometimento extra-intestinal em pacientes com Doença Inflamatória Intestinal (DII), acometendo até 25% da população pediátrica com DII. **DESCRIÇÃO DOS CASOS:** PARML, masculino, diagnosticado com doença de Crohn com 1 ano e 4 meses, ao apresentar enterorragia e parada de crescimento. Evoluiu com doença grave e fistulizante, necessitando terapia de nutrição enteral e terapia biológica (Infliximab) e imunossupressora (sirolimus). Aos 3 anos de idade, iniciou claudicação com posterior parada de deambulação, associadas a queixas algicas em coluna lombossacra e membros inferiores. Ao exame físico apresentava articulações livres e sem sinais flogísticos. Realizou ampla investigação negativa: triagem infecciosa, radiografias de coluna, ressonância magnética de coluna e quadril, cintilografia óssea e de fluxo sanguíneo ósseo, avaliação ortopédica/ reumatológica / neurológica. Realizado tratamento sintomático e intensificado tratamento da doença de base, paciente evoluiu com melhora clínica, voltando a deambular. **DISCUSSÃO:** As manifestações articulares constituem importante fator de morbidade na Doença Inflamatória intestinal, com apresentação clínica bastante variável e amplo diagnóstico diferencial. O acometimento articular pode até preceder o diagnóstico da DII. A artralgia é mais frequente que a artrite. Periféricamente, as articulações mais acometidas são as dos membros inferiores. De modo geral, a doença articular periférica correlaciona-se com presença de atividade inflamatória, enquanto o acometimento axial tem menor associação com inflamação intestinal ativa. Recusa à sustentação de peso na posição ortostática deve ser considerado um sinal de alarme, indicando necessidade de investigação. Quadros monoarticulares também devem ser prontamente avaliados. A ocorrência de parada de deambulação atribuível somente a artralgia é incomum. **CONCLUSÃO:** Queixas articulares são frequentes na DII, podendo ter importante impacto negativo na qualidade de vida. Apresentamos um caso de doença inflamatória intestinal muito precoce, que apresentou na sua evolução artralgia limitante.