



Trabalhos Científicos

Título: Etiologia Da Dor Abdominal Recorrente Em Crianças Atendidas Em Um Serviço De Gastroenterologia De Um Hospital Universitário No Rio De Janeiro

Autores: KALLYANDRA FERNANDES NEVES PIMENTEL VIEIRA; FERNANDA TEIXEIRA DE PAIVA; JOANA MAIA DE MELO; REGINA CELE MEDEIROS PEIXOTO; MARIANA TSCHOEPKE AIRES; SILVIO DA ROCHA CARVALHO; ELSA FANZERES LANGSCH DUTRA; MARCIA ANGÉLICA BONILHA VALLADARES; JOSÉ CÉSAR DA FONSECA JUNQUEIRA

Resumo: Dor abdominal recorrente (DAR), definida como dor nos últimos três meses - no mínimo três episódios com intensidade suficiente para interferir nas atividades diárias em crianças acima de três anos- afeta 10%–20% dos escolares. Objetivo: Determinar a causa de dor abdominal em crianças que apresentam esta queixa na primeira consulta, atendidas no serviço de gastroenterologia pediátrica do IPPMG/UFRJ de janeiro de 2010 a dezembro de 2015. Métodos: Todas as consultas do serviço de gastroenterologia são registradas em banco de dados Excel contendo: data de nascimento, da consulta, sexo e diagnóstico. Foram estudados todos os pacientes com queixa de dor abdominal na primeira consulta de janeiro/2010 a dezembro/2015. As consultas subsequentes foram verificadas para determinar a causa da dor. Dados foram armazenados e analisados no Excel. Determinou-se idade, sexo e causas de DAR. Resultados: 165 crianças apresentaram DAR, 50,3% sexo feminino, idade média $8,3 \pm 2,8$ anos. Destes, 12 (7,2%) necessitou internação para investigação/tratamento na primeira consulta. Sessenta e cinco não retornaram ao ambulatório. O diagnóstico foi encontrado em 75: Constipação funcional (34); Dispepsia funcional (2); Diabetes Mellitus (1); Doença Celíaca (1); Doença Péptica (14); Enxaqueca (3); Erro alimentar (3); Esofagite Eosinofílica (4); Hepatite auto Imune (1); Intolerância à lactose (2); Litíase Biliar (2); Pancreatite (1); Dripping pós nasal (3); Parasitose (2) e Colite (2). Três pacientes apresentaram vômitos e um hematoquezia, permanecendo em investigação. 25 pacientes permanecem com diagnóstico de dor abdominal a esclarecer. Conclusões: A causa mais comum de DAR foi constipação, sugerindo o importante papel desta na etiologia da DAR. Observou-se doenças orgânicas em 41 pacientes, a mais comum foi doença péptica. Literatura mostra que infecção por H. Pylori e esofagite eosinofílica são as causas mais comuns de doença orgânica. Não foi possível determinar se os 65 pacientes que não retornaram apresentaram melhora espontânea, relatada na literatura.