



## Trabalhos Científicos

**Título:** Úlcera Péptica Em Pré-Escolar

**Autores:** THAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA GOMES; ISABELLA CAMPOS RODRIGUES; PRISCILLA VALERIA VELOSO; PAULA LEITE DE ARAÚJO; NATHANAEL MACHADO COELHO NETO; LUDMILA QUEIROZ CABRAL COSTA; NATÁLIA MORAIS STELZER; LISLÂNIA MACHADO PEREIRA LOPES; POLLYANA DE FREITAS NOGUEIRA; IGNEZ CRISTINA SANTOS NETTO

**Resumo:** Objetivo: relatar um caso de úlcera péptica em criança de três anos, com queixa inicial de dor abdominal e palidez. Descrição do caso: Pré-escolar de três anos procurou pronto-socorro infantil com queixa de dor abdominal súbita e palidez. Havia relato de um episódio de hematêmese no dia anterior. Não apresentava outros sintomas ou sinais ao exame físico além de mucosas descoradas e hemograma com evidência de anemia. Durante a observação intra-hospitalar, apresentou episódios de melena. Foi realizada ultrassonografia abdominal que evidenciou espessamento focal parietal do estômago e endoscopia digestiva alta que permitiu visualização de lesão ulcerada de dois centímetros, com bordas elevadas e fundo com fibrina espessa em parede anterior de bulbo duodenal, sem sinais de sangramento ativo. Inicialmente, não foi possível realizar biópsia e pesquisa do *H. pylori*. Paciente foi mantida em tratamento com inibidor da bomba de prótons e encaminhada para acompanhamento ambulatorial, com previsão de realizar nova endoscopia digestiva alta após dois meses de tratamento. Comentários: O caso apresentado relata uma doença rara em unidade de emergência pediátrica, mas uma queixa freqüente. A paciente se manteve com baixos níveis de hemoglobina e alto índice de anisocitose, que podem estar relacionados a um quadro de parasitose intestinal prévio, relatado pela mãe ou mesmo, ser decorrente de hemorragia digestiva, se já havia sangramento ativo da lesão há mais tempo. Apesar de úlceras duodenais terem maior probabilidade de serem primárias e estarem relacionadas ao *H. pylori*, não se pode afastar uma possível causa secundária, pois há relato de uso indiscriminado de ibuprofeno nos meses anteriores. Por dificuldade técnica, não foi possível realizar pesquisa do *H. pylori* e biópsia, mas estes estão previstos para serem realizados em dois meses, o que irá ajudar a elucidar o caso quanto ao fator causal e à necessidade de tratamento específico.