



## Trabalhos Científicos

**Título:** Características De Pacientes Com Trombose De Veia Porta Em Um Serviço De Endoscopia De Um Hospital Universitário

**Autores:** ANA LUIZA BRAGA BRITO DE MACÊDO; JULIANA RAMALHO DE VACONCELOS; PAULO DUQUES DE AMORIM; DANIEL DE ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA; MÔNICA CLAUDINO MARTINS DE MEDEIROS; LAILA DANTAS MACHADO PRAZERES

**Resumo:** Objetivos: Descrever as características clínicas e endoscópicas dos pacientes portadores de trombose de veia porta (TVPo) em um ambulatório de hepatologia de um hospital universitário. Métodos: Foram revisados os prontuários de pacientes com TVPo que fazem seguimento no ambulatório de hepatologia e realizaram endoscopia no período de 2012 a 2016. Dados referentes às características clínicas e endoscópicas foram tabulados e realizada estatística descritiva e comparativa das variáveis pertinentes. Resultados: Foram selecionados 22 pacientes com diagnóstico de TVPo. A média de idade ao diagnóstico foi de 3 anos e 3 meses. Destes, 13 (59%) pacientes apresentaram hemorragia digestiva alta como primeiro sintoma da doença, os demais 9 (41%) foram diagnosticados por esplenomegalia. Metade dos pacientes realizou cateterismo umbilical no período neonatal. Na primeira endoscopia, 3 (15%) pacientes apresentavam varizes de fino calibre, 11 (57,9%) varizes de médio calibre e 13 (68,4%) de grosso calibre. O propranolol foi indicado em 17 pacientes (77%). Profilaxia secundária de sangramento foi indicada para todos os pacientes, os quais realizaram em média 3,75 endoscopias até a erradicação das varizes. Foi realizado ligadura em 13 pacientes (59%) e esclerose em 11 pacientes (50%). Complicações relacionadas à endoscopia ocorreram em 3 (13%) pacientes. Não houve nenhum óbito no período avaliado. 81% dos pacientes erradicaram varizes, sendo 63% através de procedimentos endoscópicos e 18% necessitou de cirurgia de derivação associada. O número médio de endoscopias necessário para erradicação das varizes nos pacientes que foram tratados com escleroterapia foi de 4,37 procedimentos , enquanto que os submetidos a ligadura foi 3,33 procedimentos. Conclusão: Os pacientes com TVPo tem maior propensão a sangramento digestivo, no entanto com uma boa resposta ao tratamento endoscópico. Em média, os pacientes submetidos à esclerose fizeram uma endoscopia a mais do que os submetidos à ligadura, porém não houve diferença significativa ( $p=0,32$ ).