Trabalhos Científicos

Título: Massa Pseudotumoral Em Lactente: Uma Apresentação Atípica De Tuberculose Na Infância

Autores: BÁRBARA SILVA (COMPLEXO HOSPITALAR DE NITERÓI), DANIELLE BULKOOL, GUSTAVO GUIMARÃES, LEONARDO NESE, JULIENNE ARAUJO, TERESA DOS SANTOS

Resumo: Introdução Com o aumento das taxas mundiais de tuberculose, a perinatal também é afetada. É necessário um alto índice de suspeita clínica para diagnóstico nessa faixa pediátrica. Descrição do caso Lactente interna com 13 dias de vida por quadro febril, sendo tratado como sepse suspeita. Radiografia evidenciou hipotransparência em terço superior de hemitórax direito (HTD). Estudo tomográfico revelou massa hipodensa (3,7x2,9x2,6cm) com centro escavado, associada a compressão extrínseca da traqueia. Cicatriz vacinal de BCG presente. Pais saudáveis, assintomáticos. Realizaram PPD, ambos forte reatores, sem alteração radiográfica. Ao exame físico, lactente em bom estado geral, eutrófico. Durante choro apresentava discreto estridor e cianose. PPD de 4mm. Realizou broncoscopia com visualização de compressão extrínseca do bronquio fonte direito e carina alargada. Lavado broncoalveolar inconclusivo. Investigação para tumor mesenquimal (alfafetoproteína e beta HCG) e ultrassom de abdome, sem alterações, inclusive hepática. Devido à forte suspeita clínico-radiológica, optou-se por início de esquema tríplice para tuberculose. Discussão Tuberculose pulmonar perinatal é uma doença potencialmente fatal se não for diagnosticada e tratada precocemente. O diagnóstico pode ser difícil, já que os sintomas iniciais são inespecíficos. Achado radiológico mais frequente na pediatria é consolidação. Lesões pseudotumorais com aspecto de massa em lactentes, são pouco descritas na literatura. A tomografia mostra-se superior à radiografia, podendo detectar alterações em crianças cujas radiografias sejam normais ou duvidosas. Conclusão Dada a dificuldade em encontrar bacilos em crianças, o diagnóstico é baseado em evidências epidemiológicas, clínicas e radiológicas. Forma de apresentação pseudotumoral da tuberculose em lactentes é rara, e seu diagnóstico necessita enfoque na suspeição clínico-radiológica, para evitar procedimentos invasivos nesta faixa pediátrica.