



17^o CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

Construindo pontes entre a ciência e o cuidado

PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO

Trabalhos Científicos

Título: Bezoar Misto Como Diagnóstico Diferencial De Massa Abdominal – Relato De Caso

Autores: Ana Carolina Carvalho Lima Ana Carolina Carvalho Lima 1, Milena Rios Santos Reis 1

Resumo: Objetivo(s) Relatar caso de paciente com bezoar, predominantemente misto, como causa de massa abdominal e de distúrbios gastrointestinais. Método Revisão de prontuário para coleta de dados. Resultados Paciente H.R.B., do sexo feminino, 2 anos de idade, admitida em unidade de emergência pediátrica de hospital terciário, em Salvador-Bahia, com queixa de parada de eliminação de fezes há 5 dias e cinco episódios de vômitos nas últimas 24 horas. Genitora descreve quadro de constipação crônica iniciada desde os primeiros meses de vida, com uso de diversos laxantes contínuos, sem investigação prévia adequada. Quando questionada, referiu também que paciente tem comportamento agitado e já notou hábito de levar pequenos objetos à boca. Ao exame físico da admissão, encontrava-se desidratada, com abdome distendido às custas de grande massa palpável endurecida, móvel e indolor em topografia de abdome inferior esquerdo, com demais exame segmentar normal. Iniciado tratamento da desidratação e solicitados exames complementares. Não foram encontradas alterações laboratoriais. Internada com diagnóstico de massa tumoral de etiologia a esclarecer. Foi realizado exame Ultrassonográfico de abdome que evidenciou formação expansiva hipocogênica na pelve, medindo aproximadamente 5,0 x 4,1 cm, de etiologia a esclarecer e intensa interposição gasosa em todo o abdome; e exame radiológico de Abdome com diversas imagens ovaladas radiodensas no interior do tubo digestivo com alças intestinais contendo resíduos fecais, compatíveis com corpos estranhos. A paciente foi internada, iniciado uso de laxantes oral e retal, onde permaneceu por 10 dias devido à grande quantidade de corpos estranhos em trato gastrointestinal, alguns pontiagudos, até eliminação completa dos mesmos. Evoluiu com dejeções diárias com exteriorização de grandes quantidades de corpos estranhos. Foram seriados exames radiológicos para acompanhar progressão de corpos estranhos pelo trato gastrointestinal. Genitora associou objetos metálicos visto em exame com “miçangas” de vestuário que menor costumava levar à boca. Foi acompanhada pelo serviço social e psicologia durante internamento. conclusão(ões) Destaca-se a importância da suspeita diagnóstica de bezoar como diagnóstico diferencial de massa abdominal.