



# 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

## Construindo pontes entre a ciência e o cuidado

PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO

### Trabalhos Científicos

**Título:** Características Dos Pacientes Com Doença Inflamatória Intestinal Seguidos Em Ambulatório De Gastropediatria Em Um Hospital Infantil De Referência

**Autores:** LUÍSA MARIA DE MORAIS HOLANDA 1, PALOMA EMANUELLA DE JESUS FERNANDES 1, ANALICE ALMEIDA ANDRADE 1, OHANNA GUERRA BARBALHO 1, OTÁVIA NAZARETH GOMES DA PAZ BRAGA 1, ELIENE NOVAIS OLIVEIRA , ELIANA VIDOLIN 1

**Resumo:** Objetivo(s) Caracterizar os pacientes com doença inflamatória intestinal (DII), seguidos no ambulatório de gastropediatria, em hospital infantil de referência. Método Estudo descritivo, transversal por revisão de prontuários no período entre Janeiro 2012 a março de 2018. Utilizaram-se critérios clínicos, endoscópicos e histológicos para diagnóstico. Foram estudadas as variáveis: tipo, sexo, antecedentes familiares, idade à data do início dos sintomas e diagnóstico, intervalo de tempo entre sintomatologia e diagnóstico, sinais e sintomas iniciais, doenças associadas, padrão colonoscópico, estado nutricional e classificação de gravidade. Resultados Foram incluídas 27 crianças, média de 4,5 novos casos/ano, com pico em 2017 com 8 casos/ano. 37% (10) eram Doença de Crohn (DC) e 63% (17) Retocolite Ulcerativa (RCUI). Na DC, 70% (7) era feminino e na RCUI 47% (8). Não foi encontrado antecedente familiar para DII. A idade de início dos sintomas variou entre 11 meses e 194,4 meses, mediana de 87,6 meses. A mediana de tempo entre o início dos sintomas e diagnóstico foi 4 meses. A queixa inicial mais frequente foi diarreia sanguinolenta 74% (19), seguida de dor abdominal 50% (13) e diarreia sem sangue 22% (6). 18,5% (5) tiveram lesão perianal, todos com DC. 60% (16) dos casos apresentaram anemia. 14% (4) manifestações extra intestinal. Colangite esclerosante foi a única doença associada, encontrada em 26% (7), apenas nos pacientes com RCUI. De acordo com a classificação de Montreal, 73% (11) das RCUI apresentaram padrão colonoscópico de pancolite e 27% (6) colite esquerda. Na DC, 10% (1) apresentou apenas comprometimento do trato gastrointestinal (TGI) superior, 60% (6) ileocolônico e 10% (1) ileo terminal e TGI superior. 61,5% (17) tinham IMC menor ao escore z-2 ao diagnóstico. Conforme o Pediatric Crohn's Disease Activity Index 90% (9) apresentaram manifestações de moderada a grave. Na RCUI, de acordo com o Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index, 28% (5) apresentaram forma grave, 54% (10) moderada e 18% (2) leve. conclusão(ões) Nossos resultados concordam com dados da literatura mundial, sendo discrepante em relação ao sexo predominante na DC (masculino na maioria dos estudos). A diarreia foi o sintoma mais encontrado, discordando de outros estudos que apontam a dor abdominal como principal sintoma.