



# 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

Construindo pontes entre a ciência e o cuidado

PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO

## Trabalhos Científicos

**Título:** Drenagem Ecoguiada De Pseudocisto Pancreático De Origem Traumática

**Autores:** Silvio Kazuo Ogata 1

**Resumo:** Objetivo(s) Relatar um caso de adolescente que sofreu trauma abdominal fechado com formação de pseudocisto pancreático, sendo submetido a drenagem endoscópica ecoguiada. Método Resultados Paciente, masculino, 13 anos, com história de trauma abdominal evoluiu com abdome agudo. Na laparotomia identificou-se líquido peripancreático com lesão no pâncreas de 4 cm, tratado com rafia e drenagem retroperitoneal. Evoluiu com hiperamilasemia persistente, dor e massa abdominal palpável. TC de abdome revelou lesão cística de 12 cm na topografia do pâncreas, comprimindo estômago. Encaminhado para o Hospital São Paulo para drenagem endoscópica, 6 semanas após o trauma. À endoscopia foi visto abaulamento gástrico, sem sinais de varizes esofagogástricas. Ecoendoscopia foi indicada para melhor avaliação do conteúdo do pseudocisto. Observou-se volumoso cisto, unilocular, bem delimitado, homogêneo, hipocóico e sem evidências de necrose, com 11 cm de diâmetro, adjacente a parede gástrica (5mm). Realizado drenagem ecoguiada conforme técnica padrão, com agulha 19G, seguido de dilatação e passagem de uma prótese plástica duplo pigtail de 8,5Fr com drenagem de líquido seropurulento. Não foi feito a pancreatografia endoscópica. Controle clínico e tomográfico em 5 dias revelou melhora sintomática, e redução do pseudocisto. Após 4 meses, paciente encontrava-se assintomático com resolução completa do pseudocisto, sendo encaminhado para retirada da prótese. DISCUSSÃO: Trauma fechado de abdome com lesão de pâncreas e ruptura de ducto pancreático pode evoluir com formação de coleção e aparecimento de pseudocisto pancreático. O tratamento endoscópico é indicado, como neste caso (dor e persistência do pseudocisto). A drenagem endoscópica é o método preferencial e consiste da drenagem transmural, de preferência, ecoguiada. A pancreatografia com intenção de identificar o local de ruptura do ducto para colocação de uma prótese pancreática (drenagem transpapilar) pode ser feita, entretanto, atualmente há autores que indicam apenas a drenagem do pseudocisto. conclusão(ões) Drenagem endoscópica de pseudocisto após lesão pancreática por trauma abdominal fechado é uma alternativa segura e eficaz, mesmo em crianças, evitando a cirurgia.