



# 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

## Construindo pontes entre a ciência e o cuidado

PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO

### Trabalhos Científicos

**Título:** Duplicação Intestinal: Causa Rara De Hemorragia Digestiva Em Lactentes – Relato De Caso

**Autores:** Aline Portela Muniz 1, Amália Maria Porto Lustosa 1, Danielle Maria Frota Lafuente 1, Edna Dias Marques Rocha 1, Fabiana Maria Silva Coelho 1, Gisella Del Aguila Sanchez 1, Guilherme Porto Lustosa 1, Hildenia Baltasar Ribeiro Nogueira 1, Jamille Linhares Feijó Pierre 1, Joana Oliveira Nóbrega 1, José Holanda Maia Filho 1, Lara Peixoto Moreira Lima Loiola 1, Maria Júlia Rodrigues Teixeira 1, Marta Lucia Moura Sacramento Silva 1, Mikaelle Severo Marques Mateus 1, Natália Feitosa Pinheiro Cunha 1, Nicole de Oliveira Bezerra e Beserra 1, Rocino Marinho de Oliveira Neto 1, Rodrigo Schuler Honorio 1, Ticiana Quixada Fontenele 1

**Resumo:** Objetivo(s) Descrever o caso de um paciente pediátrico com hemorragia digestiva em área de duplicidade duodenal. Método Os dados deste relato foram revisados do prontuário do paciente acompanhado em hospital pediátrico terciário. Resultados Paciente masculino, 7 meses, com história prévia de laparotomia exploradora aos 4 meses de idade por abdome agudo hemorrágico, com suspeita de ruptura espontânea de baço, visto que em relatos cirúrgicos não foi visualizado baço. Paciente foi encaminhado a hospital infantil terciário com quadro de diarreia com rajas de sangue, evoluindo com vômitos inicialmente com restos alimentares e posteriormente biliosos e após com hematemesa e melena. Em avaliação da hemorragia digestiva, contatou-se anemia severa (hemoglobina de 5,9), com necessidade de transfusões recorrentes. Realizado endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia abdominal com doppler portal sem alterações, apresentando períodos de melhora e piora do quadro. Realizado tomografia computadorizada abdominal, evidenciando duplicidade gástrica em fundo cego, sem comunicação com TGI, assim como imagem sugestiva de duplicidade de duodeno, com pequena quantidade de líquido livre na cavidade e sinais de má rotação intestinal. Decidiu-se por realizar laparotomia exploradora, confirmando os achados radiológicos e evidenciando presença de fístula da duplicidade duodenal para cólon descendente e alterações anatômicas compatíveis com asplenia congênita. A duplicação gastroduodenal é uma anomalia rara (1:4500 nascidos), sendo a formação de fístula no cólon, uma causa rara de hemorragia gastroduodenal na infância. A duplicação digestiva tem caráter benigno, porém pode apresentar riscos graves de hemorragia digestiva pela presença de mucosa gástrica ectópica nessas áreas (25 a 30% dos casos), sendo a duplicidade gastroduodenal correspondente apenas a 3% dessas. conclusão(ões) O relato de duplicação intestinal como causa rara de hemorragia digestiva em lactentes, especialmente em crianças menores de 2 anos, alerta para a importância de um diagnóstico precoce para uma abordagem adequada, evitando a mortalidade por essa etiologia.