17º CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

Construindo pontes entre a ciência e o cuidado

PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO

Trabalhos Científicos

Título: Enterocolite Induzida Por Proteinas Alimentares (Fpies): Serie De Casos

Autores: Jarbas José Avila Júnior 1

Resumo: Objetivo(s) Descrever as características epidemiológicas, clinicas, alimentos relacionados, diagnostico e evolução de pacientes que tiveram quadro de FPIES agudo. Método Estudo retrospectivo, com revisão de prontuários de pacientes atendidos no ambulatório de gastroenterologia pediátrica de hospital pediátrico, com revisão de 6 casos de crianças com diagnostico inicial de alergia a proteína do leite de vaca (APLV) que evoluíram para quadros de FPIES, idades entre 2 e 12 meses de idade entre os anos de 2015 e 2017. Resultados Foram 6 casos diagnosticados de FPIES com evoluções diversas. Sendo 2 casos mais graves com internamento em UTI e quadros de desidratação e acidose metabólica. Somados todos os casos obteve-se 24 episodios de sintomas agudos (media de 4 episodios por criança), com 7 intervencoes em UTI; sendo os alimentos alergênicos mais associados: leite de vaca (5/6: 83,3%), arroz (4/6: 66,6%), soja (3/6: 50%), clara de ovo (3/6: 50%), cereais (milho, cevada, trigo, aveia) (2/6: 33,3%), banana, maca, abacate e batata (1/6: 16,6%). Destaca-se o fato de que as reações mais precoces (menores de 2 meses de idade) e rápidas (menos de 30 minutos) ocorreram frequentemente com a exposição ao leite de vaca e a soja. Os sintomas mais envolvidos foram: vômitos incoercíveis em jato (6/6: 100%), letargia tipo sincope (6/6: 100%), diarreia profusa (4/6: 66,6%), baixo ganho ponderal (4/6: 66,6%). Destaca-se o fato de que os que tiveram reações a ingestão de arroz e cereais tiveram reações mais graves e maior necessidade de realização de hidratação venosa do que as crianças com reações a ingestão de leite, ovo e soja. Ressalta-se que (4/6: 66,6%) das crianças tiveram quadro de proctocolite alérgica com sangramento nas fezes em vigência de aleitamento materno exclusivo antes de desencadear as reações de FPIES aguda. conclusão(ões) A FPIES aguda pode ocorrer como consequência a ingestão de vários alimentos, sendo as manifestações mais rápidas as apresentadas após administração do leite de vaca e as mais tardias após ingestão de alimentos sólidos. Nem sempre o teste de desencadeamento precisa ser realizado para confirmar o diagnostico sendo relevante a historia clinica e a melhora dos sintomas com a retirada do alimento alergênico porem seu diagnostico deve ser precoce devido a gravidade de sua evolução.