



17º CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

Construindo pontes entre a ciência e o cuidado

PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO

Trabalhos Científicos

Título: Pacientes Com Imunodeficiência Predominantemente De Anticorpos Com Manifestações Clínicas E Laboratoriais Similares À Doença Celíaca: Relatos De Três Casos

Autores: Ilanna Fragoso Peixoto Gazzaneo 1, Barbara Barros de Figueiredo 1, Camila Fonseca Leal de Araújo 1, Michela Cynthia da Rocha Marmo 1, Paula Texeira Lyra 1, Ana Carla Augusto Moura Falcão 1

Resumo: Objetivo(s) Descrever manifestações clínicas e laboratoriais gastrointestinais similares à doença celíaca em três pacientes com imunodeficiência humoral. Método Estudo tipo relato de caso. Dados coletados dos prontuários. Pacientes acompanhados nos ambulatórios de imunologia e gastroenterologia de um hospital pediátrico de referência da cidade do Recife. Resultados Paciente 1, feminino, 12 anos, diarreia aquosa há 8 anos, episódios de pneumonia e déficit pondero-estatural. Exames: IgM 1484 (percentil >97), IgA 4,4 (percentil Paciente 2, feminino, 10 anos, pneumonias, abscesso esplênico, piodermite, diarreia crônica aquosa e hepatoesplenomegalia. Pais consanguíneos, irmã falecida de infecção bacteriana grave. Exames: IgG 275 (percentil Paciente 3, masculino, 4 anos, diarreia e distensão abdominal desde os 2 meses de vida. Episódios de ascite e abscesso em axila. Déficit pondero-estatural e anemia. Biópsia duodenal com duodenite crônica leve, atrofia vilositária sem hiperplasia de cripta ou linfocitose. Anticorpos antitransglutaminase IgA e IgG negativos. Iniciado dieta sem glúten com boa resposta. Posterior recidiva da diarreia e nova biópsia duodenal sem atrofia vilositária. IgG e CD4+ baixos, diagnosticando ICV. Recebeu gamaglobulina venosa com boa resposta e melhora dos sintomas. conclusão(ões) As imunodeficiências primárias humorais podem acarretar queixas gastrointestinais sendo parte do diagnóstico diferencial da diarreia crônica. Os pacientes que não preenchem totalmente critérios para a doença celíaca ou que mantém sintomas mesmo após a dieta sem glúten devem ser investigados para imunodeficiências primárias.