



17<sup>o</sup> CONGRESSO  
BRASILEIRO DE  
GASTROENTEROLOGIA  
PEDIÁTRICA

Construindo pontes entre a ciência e o cuidado

PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO

**Trabalhos Científicos**

**Título:** Perfil De Indicações E Resultados De Exames Endoscópicos Encaminhados Por Um Serviço De Gastroenterologia Pediátrica.

**Autores:** CRISTIANE HARUMI BAZHUNI TSUGE NEIVA 1, GIUSEPPE MARIA SANTALUCIA 1, VERONICA SANTOS DE OLIVEIRA 1, MOISES COPELMAN 1, EDUARDO MADEIRA 1, FELIPE ALVES MOTA REBELLO DE MENDONCA , MARIANNA AMIN AAD REIS 1, NATHALIA MARINHO FERREIRA 1, GLAUCIA LEITAO MIRANDA 1, ANNA LETICIA DE CERQUEIRA CAMPOS VILLARDI 1, LEONARDO JABOUR FERREIRA 1, TAMIRES DOS SANTOS ROCHA 1, LIVIA MACHADO GUIMARÃES 1, JULIANA BAPTISTA PIEDADE BARROCAS 1

**Resumo:** Objetivo(s) Traçar o perfil de pacientes pediátricos submetidos a exames endoscópicos em um Hospital Geral, encaminhados pela Gastroenterologia Pediátrica e avaliar a correlação clínica e diagnóstica. Método Avaliação retrospectiva de dados como: indicação, idade, sexo, laudos endoscópico e histopatológico e complicações no período de janeiro de 2016 a fevereiro de 2018. Resultados Durante o período, 78 pacientes com idade entre 14 meses a 15 anos, realizaram exames endoscópicos sendo 37 do sexo feminino e 41, masculino. Parte dos exames foi realizado no setor de endoscopia, sob sedação (15) e os outros pacientes (63,) em centro cirúrgico com anestesista. Do total de exames, 61,2% foram esofagogastroduodenoscopias, das quais 58 % diagnósticas e 42% com finalidades terapêuticas; 32% colonoscopia e 3% colangiopancreatografias endoscópicas retrógradas (CPRE). A dor abdominal recorrente foi a principal indicação (14). A maioria (8) obteve laudo normal, mas houve diagnósticos variados: gastrite endoscópica erosiva plana, com correspondentes achados histopatológicos e pesquisa de *Helicobacter pylori* positiva em 2/3; linfangiectasia duodenal (2), e achado histopatológico de *Giardia lamblia* (1); adelgaçamento de mucosa duodenal (1), sugestivo de doença celíaca, porém não confirmada. Outras indicações foram: disfagia (5), vômitos persistentes (4), hemorragia digestiva alta (3), dor torácica (1), suspeita de linfangiectasia primária (1) e ingestão de cloro (1). Em relação às endoscopias com finalidade terapêutica, a ligadura elástica de varizes de esôfago (12) prevaleceu, principalmente por trombose de veia porta, seguido por dilatação de estenose esofágica (3), retirada de corpo estranho (1) e gastrostomia endoscópica percutânea (GTT) (1). A principal indicação de colonoscopia foi a investigação de hemorragia digestiva baixa (12), cuja causa mais comum foi pólipos juvenis (80%), confirmado no histopatológico. Em seguida, a investigação de diarreia crônica com sangue e muco (7), com doença inflamatória intestinal diagnosticada em 71% dos casos, além de tuberculose intestinal em um dos casos. Foram realizadas ainda três CPRE, por pancreatite de repetição e cálculo em via biliar. Laringoespasmos foi a única complicação anestésica, sem complicações endoscópicas nesta casuística. conclusão(ões) Os exames contribuíram para o raciocínio clínico e tomada de decisão ao detectar causas, oportunizar o tratamento específico, e melhorar a qualidade de vidas dos pacientes.