



# 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

## Construindo pontes entre a ciência e o cuidado

PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO

### Trabalhos Científicos

**Título:** Relato De Caso: Atresia Duodenal Com Eliminação De Mecônio Em Recém Nascido.

**Autores:** victor batitucci ribeiro 1, Ana Paula Felgueiras 1

**Resumo:** Resumo Objetivo(s) Descrever quadro de atresia duodenal com eliminação de mecônio durante o nascimento em recém nascido. Método Estudo descritivo, do tipo relato de caso, realizado a partir da revisão de prontuário médico. Resumo Resultados A.M.C.D, 23 anos, G3P2C. Pré-natal com 3 consultas, sorologias negativas. Entrou em trabalho de parto espontâneo, sendo optado por cesárea por iteratividade, com amniotomia no ato, apresentando mecônio. RN do sexo masculino, peso 3070 g, 49 cm de comprimento, 35 cm de PC, apgar 7/8. Capurro 37 semanas e 1 dia. Com 40 horas de vida, apresentou episódios de vômitos biliosos, sem apresentar evacuação desde o nascimento. Realizado Rx de abdome, com ausência de ar em ampola retal, com distensão de alças, com 2 bolhas maiores centrais e 2 bolhas menores laterais. Exame físico sopro sistólico (1+/4+), abdome: normotenso, ruído hidroaéreo positivo, sem visceromegalias, sem massas palpáveis, aúus aparentemente pérvio. Admitido em UTI neonatal, inserido sonda nasogastrica aberta com débito de 76 ml de líquido amarelado. Realizado laparotomia exploradora com enterectomia, enteroanastomose e apendicectomia tática. Evoluiu de forma satisfatória, sem intercorrências, com alta da UTI neonatal, no 3º dia de pós operatorio. conclusão(ões) A atresia duodenal é um defeito congênito, é uma das causas mais frequentes de obstrução intestinal no recém-nascido. O tratamento é cirúrgico, de bom prognóstico. A mortalidade é maior em prematuros, recém nascidos que apresentam síndrome do desconforto respiratório, anomalias associadas ou complicações, como síndrome do intestino curto.