



# 17<sup>o</sup> CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

## Construindo pontes entre a ciência e o cuidado

PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO

### Trabalhos Científicos

**Título:** Relato De Caso: Cisto Mesentérico Em Recém Nascido Do Sexo Feminino

**Autores:** victor batitucci ribeiro 1, Leonardo da Cruz Andrade 2, Marcia Borges Machado 1, Sebastião Rizzo Neto 2

**Resumo:** Resumo Objetivo(s) Descrever quadro de cisto mesentérico em um paciente recém nascido do sexo feminino. Método Estudo descritivo, do tipo relato de caso, realizado a partir da revisão de prontuário médico. Resumo Resultados D.O.T, 23 anos, do lar, G2P0C1, pré natal desde com 8 consultas. Sorologias negativas. Não entrou em trabalho de parto, sendo feito amniotomia artificial com exteriorização de líquido claro. Realizada cesárea por iteratividade e presença de mecônio. Ao nascimento, recém nascido apresentava-se com 3719 g, 47,5 cm, PC 33 cm, PT 35 cm, Apgar 9 e 9. Capurro: 38 semanas e 4 dias. Sexo feminino. Liberado para o alojamento conjunto. Com 6 horas, iniciou quadro de náuseas e vômitos. Ao exame físico, evidenciou-se a presença de uma massa cística de 5 cm de diâmetro em região paraumbilical direita, sem alterações. Foi realizado USG de abdome com presença de “imagem cística” em região anexial direita. Transferido para UTI neonatal. TC de abdome com contraste evidenciou cisto mesentérico próximo a válvula ileocecal. Foi abordado cirurgicamente no 2º dia de vida e evoluiu bem no pós operatório imediato, com SOG aberta e em uso de NPP. No 3º PO, foi observado leucocitose com 5% de bastões e administrado Oxacilina + Amicacina, sem a necessidade de drogas vasoativas. Tratou infecção e evoluiu bem, recebendo alta hospitalar depois de alguns dias. Hemocultura: Staphylococcus epidermidis. conclusão(ões) Cisto mesentérico é um tumor benigno, com apenas 3% de malignidade, raro, de diagnostico radiológico. A sua localização é bastante variada, podendo ocorrer em qualquer porção do mesentério. O tratamento é cirúrgico, com remoção do cisto. Sua evolução é de bom prognostico.