



17º CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

Construindo pontes entre a ciência e o cuidado

PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO

Trabalhos Científicos

Título: Úlcera Gástrica Em Menino De 4 Anos Como Única Manifestação De Linfoma Do Tipo Burkitt – Relato De Caso

Autores: Mikaelle Severo Marques Mateus 1, Fabiana Maria Silva Coelho 1, Danielle Maria Frota Lafuente 1, Nicole de Oliveira Bezerra e Beserra 1, Lara Peixoto Moreira Lima Loiola 1, Gabriela Coutinho Gondim da Justa 1, Rodrigo Schuler Honorio 1, Edna Dias Marques Rocha 1, Hildenia Baltasar Ribeiro Nogueira 1, Joana Oliveira Nóbrega 1

Resumo: Objetivo(s) Descrever o caso de um paciente pediátrico com hemorragia digestiva alta por úlcera gástrica, com diagnóstico final de Linfoma de Burkitt. Método Os dados deste relato de caso foram colhidos através de revisão de prontuário de paciente acompanhado em hospital pediátrico terciário. Resultados Paciente do sexo masculino, 4 anos de idade, previamente hígido, iniciou sintomas há 15 dias da data da internação, com dor abdominal intensa, que piorava com alimentação. Progrediu com vômitos com restos alimentares, seguido por vômitos de coloração escura, e perda de peso de dois quilos no período. Em avaliação médica, foi evidenciado anemia importante e instabilidade hemodinâmica, necessitando de hemotransusão. Após estabilização clínica, foi realizada endoscopia digestiva alta, que evidenciou extensa úlcera gástrica ativa em antro. Estudo histopatológico da lesão diagnosticou Linfoma não Hodgkin de células B, compatível com Burkitt. Mantido em suporte terapêutico com omeprazol e sucralfato, evoluindo sem novos episódios de vômito, e encaminhado para seguimento com equipe de Oncologia, com início de protocolo de quimioterapia. Os Linfomas Não-Hodgkin (LNH) são responsáveis por cerca de 60% dos casos de linfoma em crianças e adolescentes, sendo mais frequente no sexo masculino. Eles podem ser divididos em três tipos: Linfoma linfoblástico, Linfoma de Burkitt (LB) e os Linfomas de Grandes Células. O LNH gastrointestinal primário é pouco frequente, representando 9% de todos os LNH. O LB é um linfoma de células B de alto grau de malignidade, que representa de 25 a 30% dos casos de LNH em criança não soropositivas. Ele geralmente se inicia no abdome, mas envolvimento do estômago e pâncreas é esporádico na criança e bastante raro, representando menos de 2% dos casos. conclusão(ões) O relato de uma manifestação rara de linfoma de burkitt, especialmente em uma criança de 4 anos de idade, alerta para a importância de um diagnóstico precoce para que se possa ter uma abordagem adequada e, consequentemente, um melhor prognóstico para o paciente.