



17º CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

Construindo pontes entre a ciência e o cuidado

PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO

Trabalhos Científicos

Título: Varizes Retais Como Causa De Hemorragia Digestiva Baixa Na Faixa Etária Pediátrica; Um Relato De Caso.

Autores: Fernanda Souza de Macedo 1

Resumo: Resumo Objetivo(s) Varizes retais são definidas como veias dilatadas que se originam a mais de 4cm além da margem anal, sendo então não contíguas com a linha pectínea e distinguindo-se das hemorroidas. A incidência dessas varizes em pacientes cirróticos variam entre 38% e 56%, entretanto seu sangramento é raro, variando de 0.5 a 5% dos casos. Enquanto que o tratamento das varizes esofágicas é bem estabelecido na literatura, o tratamento das varizes retais permanece não definido. A terapia endoscópica, realização de shunts (TIPS), oclusão transvenosa retrógrada por balão (BRTO), e tratamento cirúrgico são algumas das opções terapêuticas das varizes retais. O objetivo desse estudo é relatar um caso sobre varizes retais associado a hemorragia digestiva baixa e propor uma revisão sobre as opções terapêuticas de hemorragia digestiva baixa por rompimento de varizes retais em crianças. Método O método desse estudo é um relato de caso sobre o tema Resultados Trata-se de um paciente de 5 anos, com diagnóstico de cirrose hepática secundária a trombose de veia porta. Relatava episódios prévios de hemorragia digestiva alta e estava em profilaxia secundária para hemorragia digestiva alta varicosa com relato de escleroterapia endoscópica prévia. Há cerca de 3 meses relatava quadro de diarreia associada a hematoquezia, sendo então solicitado exames para investigação do caso. Realizada endoscopia na qual foram visualizadas varizes de fino calibre interrompidas por áreas de aspecto cicatricial no esôfago distal, varizes subcárdicas e gastropatia da hipertensão portal. Colonoscopia evidenciou múltiplos tufo varicosos no reto, sem pontos de ruptura evidentes. Devido ao quadro de hemorragia sem repercussão hemodinâmica ou hematemática optou-se pela observação do quadro, não se instituindo terapêutica endoscópica neste momento. Paciente segue em acompanhamento, sem novos episódios de sangramentos desde então. conclusão(ões) A hemorragia digestiva baixa decorrente do rompimento de varizes retais é um evento raro na faixa etária pediátrica, porém de alta gravidade podendo ser fatal. Ele é decorrente da hipertensão portal em pacientes cirróticos e seu manejo não é bem estabelecido pela literatura atual, não havendo consenso sobre a terapia a ser instituída. Esse trabalho objetiva o relato de um caso de hemorragia digestiva baixa decorrente ao provável rompimento de varizes retais com boa evolução após tratamento clínico e a discussão sobre as possíveis terapêuticas relatadas na literatura sobre o tema.