



# 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

## Construindo pontes entre a ciência e o cuidado

PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO

### Trabalhos Científicos

**Título:** Dor Abdominal Como Manifestação Clínica De Agenesia De Vesícula Biliar Na Infância

**Autores:** Fernanda Maso Stranguetti 1, Iara Ferreira Lopes 1, Kelle Santos Aguilar 1, Adriana Maria Alves de Tommaso 1, Gabriel Hessel 1, Maria Ângela Bellomo Brandão 1

**Resumo:** Objetivo(s) Relatar um caso extremamente raro de agenesia de vesícula biliar com sintomatologia incomum na infância. Método Descrição de caso através de coleta e análise de dados contidos em prontuário médico. Resultados Paciente feminino, 11 anos, iniciou em fevereiro de 2015, quadro de dor abdominal em cólica, de forte intensidade, localizada em hipocôndrio direito, sem irradiação, acompanhada de vômitos não biliosos e desencadeada por alimentação gordurosa. Procurou pronto atendimento médico em outubro de 2015, onde foi realizada ultrassonografia de abdome, que não evidenciou anormalidades nos órgãos avaliados, porém não foi visualizada a vesícula biliar. Devido à persistência da dor abdominal, pediatra que fazia a puericultura, encaminhou a criança para o ambulatório de Hepatologia pediátrica para investigação. Foi solicitado hemograma, perfil hepático, amilase e lipase, todos sem alterações. Além de nova ultrassonografia de abdome com tempo de jejum adequado, em que novamente não foi possível observar a vesícula biliar, com fígado dentro dos limites da normalidade, sem alterações de vias biliares intra- hepáticas. Após resultados dos exames, foi solicitado Colangiorressonância magnética para pesquisa de malformação, em que foi verificada ausência de vesícula biliar, sem dilatação de vias biliares e sem outras anormalidades ao exame. Assim, foi confirmado o diagnóstico de agenesia de vesícula biliar, e após orientação de dieta hipogordurosa criança mantém-se assintomática, sem novos episódios de crise algica, com desenvolvimento, crescimento e ganho de peso adequados. conclusão(ões) A agenesia da vesícula biliar é uma condição muito rara, devido a uma falha do desenvolvimento embriológico. Pode estar associada a outras anomalias congênitas, porém é mais frequentemente encontrada isolada. Não há relatos de dor abdominal como manifestação clínica de agenesia de vesícula biliar na infância, apenas sendo descrita em adultos. No entanto, o diagnóstico dessa malformação deve ser evocado frente à ausência de visualização da vesícula na ultrassonografia, e a Colangiorressonância magnética pode confirmar o diagnóstico e evitar cirurgia que poderia colocar o paciente em risco desnecessário.