



17º CONGRESSO BRASILEIRO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

Construindo pontes entre a ciência e o cuidado

PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO

Trabalhos Científicos

Título: Sucesso Do Shunt Portossistêmico Intra-Hepático Via Transjugular (TIPS) No Tratamento Da Hipertensão Portal Em Adolescente Com Lupus Eritematoso Sistêmico (Les).

Autores: Bianca Furlan Fernandes 1, Paloma Estefanne Barboda dos Santos 1, Gabriel Nuncio Benevides 1, Tamires M. Bernardes 1, Adriana Almeida de Jesus 1, Adriana Maluf Sallum 1, Karina Lucio Medeiros 1, Clovis Artur Almeida da Silva 1, Ramiro Antero Azevedo 2

Resumo: Objetivo(s) Relatar um caso de sucesso na realização de Shunt Portossistêmico Intra-hepático via Transjugular (TIPS, em inglês) como tratamento de ascite refratária a terapia medicamentosa otimizada e paracentese seriadas em adolescente com Lupus Eritematoso Sistêmico (LES). Método Revisão de prontuário e pesquisa nas bases de dados Medline e LiLacs. Resultados Paciente de 16 anos, sexo masculino, interna devido a derrame pleural, derrame pericárdico e ascite. Acompanhado no serviço devido a Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) e hipertensão portal sem causa definida, não cirrótico, em uso de imunossupressão. Evoluiu na internação, apesar do tratamento, com choque séptico, peritonite bacteriana por E. coli, ascite refratária com repercussão hemodinâmica, necessitando de paracentese semanal de alívio. Durante internação apresentou três episódios de hemorragia digestiva alta. USG doppler com veias hepáticas pérvias, descartada trombose de veia porta. Optado por realização de Shunt Portossistêmico Intra-hepático Transjugular (TIPS) pela radiologia intervencionista, com embolização de varizes de fundo gástrico e retirada de 7,1 litros de líquido ascítico, reduzindo gradiente pressórico venoso-portal de 23 para 3 mmHg. Após o procedimento houve resolução da ascite e possibilitou alta após internação de 4 meses. No retorno ambulatorial após 6 meses da alta paciente permanece sem ascite com bom fluxo sanguíneo pelo TIPS. conclusão(ões) A experiência da realização de Shunt Portossistêmico Intra-hepático Transjugular na pediatria é limitada a poucos estudos retrospectivos. A maioria dos casos descritos submetidos a tal procedimento são de crianças com hemorragia digestiva alta recorrente. Expandimos com esse relato o sucesso na realização do TIPS em crianças na resolução de ascite grave refratária a terapia medicamentosa e paracenteses seriadas.