

Trabalhos Científicos

Título: Epidemiologia Das Nefropatias Pediátricas Em Um Serviço De Nefropatologia De Minas Gerais

Autores: MARIA LUÍZA GONÇALVES DOS REIS MONTEIRO; LÍVIA HELENA MORAIS PEREIRA; LAURA PENNA ROCHA; CRISLAINE APARECIDA SILVA; LILIANE SILVANO ARAÚJO; CLÁUDIA RENATA BIBIANO BORGES; FERNANDA RODRIGUES HELMO; JULIANA REIS MACHADO; ROSANA ROSA MIRANDA CORRÊA; MARLENE ANTÔNIA REIS

Resumo: Objetivos: Descrever características clínico-epidemiológicas das biópsias renais pediátricas, analisadas em um Serviço de Nefropatologia de Minas Gerais, no período entre 1996 até 2014. Metodologia: Os casos foram organizados em tabela com ano de realização da biópsia, identificação segundo código do serviço, idade, se rim nativo ou transplantado, procedência e diagnóstico. Quanto à procedência, os pacientes foram divididos de acordo com seu estado de origem. Posteriormente, foram agrupados de acordo com o diagnóstico. Foi calculada a média de idade para cada grupo diagnóstico. Resultados: Foram analisadas 231 biópsias renais de pacientes com 0 a 18 anos de idade entre 1996 e 2014. A média das idades foi $13,07 \pm 13,07$ anos. A maioria dos pacientes, 194 (83,98%) indivíduos, procedia de Minas Gerais. Dezesesseis (7,07%) biópsias eram de pacientes transplantados; com média de $14,12 \pm 3,73$ anos. Podocitopatias corresponderam à nefropatia mais prevalente, 22,94% dos casos. Em seguida, Nefrite Lúpica com 15,58% e Doença de Berger com 11,25% dos casos. Outros diagnósticos encontrados, em ordem de frequência foram: Glomerulonefrite Crescêntica tipo II, Glomerulopatia Crônica, Glomerulonefrite Difusa Aguda, Glomérulos normais, Síndrome de Alport, Glomerulopatia Membranosa, Glomerulonefrite Membranoproliferativa, Microangiopatia Trombótica, Nefrite túbulo-intersticial crônica, Púrpura de Henoch-Scholein, Glomerulopatia Colagenofibrótica, Glomerulopatia por Fibronectina, Síndrome de Denys Drash, Deficiência de Lecitina- Colesterol Aciltransferase e Doença da Membrana Fina. Conclusões: As características clínico-epidemiológicas descritas evidenciam predomínio de pacientes provenientes de Minas Gerais e das Podocitopatias como principal causa de nefropatia pediátrica. Descreve-se ainda a ocorrência de nefropatias raras.