

Trabalhos Científicos

Título: Disfunção Do Trato Urinário Inferior Em Crianças Menores De 5 Anos: Quando Suspeitar?

Autores: PAULA GARCEZ OLIVEIRA HAZAN DA FONSECA; ELIANE MARIA GARCEZ OLIVEIRA DA FONSECA; MARIA ESTELA ROCHA MELLO; THAIS LIRA CLETO; VERA QUEIROZ MACHADO; FERNANDA RODRIGUES DE CARVALHO

Resumo: Objetivo: identificar as principais manifestações clínicas da disfunção do trato urinário inferior (DTUI) em menores de 5 anos. Metodologia: Estudo transversal baseado na revisão dos prontuários de crianças menores de cinco anos atendidas com DTUI não-neurogênica no período de Janeiro de 2008 a Dezembro de 2012. A revisão baseou-se na anamnese padronizada de primeira consulta. As variáveis estudadas foram idade, sexo, motivo do encaminhamento e sinais e sintomas. Resultados: No período de Janeiro de 2008 a Dezembro de 2012, foram atendidas 472 crianças com DTUI, das quais 56 (11,9%) eram menores de 5 anos. A idade média foi de 3,25 anos e a mediana 4,0; 44 (78,6%) eram do sexo feminino e 12 (21,4%) masculino. A distribuição por faixa etária das crianças foi: 1 ano: 6 (10,7%), 2 anos: 6 (10,7%), 3 anos: 12 (21,4%) e 4 anos: 32 (57,1%). A infecção do trato urinário (ITU) foi o motivo de encaminhamento em 100% das crianças de 1 e 2 anos, 71,4% aos 3 anos e 30,4% aos 4 anos. A perda urinária foi responsável por 28,6% dos encaminhamentos aos 3 anos e 69,6% aos 4 anos. As manifestações mais frequentes foram: constipação intestinal (67,3%), história de ITU (60,7%) e ITU febril (53,6%), perda urinária (50,0%), dificuldade para urinar (16,1%) e diminuição da frequência urinária (12,5%). Conclusão: A ITU foi a principal manifestação clínica nos lactentes com DTUI e a constipação intestinal, a mais comum na faixa etária de 0 a 4 anos.