Trabalhos Científicos

Título: Histiocitose Pulmonar: Um Caso Pediátrico

Autores: MONISE SANTOS DE CARVALHO (UNIFESP), BEATRIZ NEUHAUS BARBISAN (UNIFESP), SÔNIA MAYUMI CHIBA (UNIFESP), CLÓVIS EDUARDO TADEU GOMES (UNIFESP), HENRIQUE MANOEL LEDERMAN (UNIFESP), RIMARCS GOMES FERREIRA (UNIFESP)

Resumo: Este trabalho visa relatar o caso de um escolar masculino que foi atendido no ambulatório de Pneumologia Pediátrica do Hospital São Paulo (UNIFESP) e, posteriormente internado na enfermaria pediátrica do mesmo serviço. Através da discussão clínica, radiológica e patológica , foi possível realizar o diagnóstico de Histiocitose de Células de Langerhans com acometimento pulmonar. " Relatar um caso clínico do ambulatório de Pneumologia pediátrica do Hospital São Paulo afim de alertar pediatras para os casos raros desta patologia, principalmente em acometimento pulmonar isolado. "Estudo observacional de braço único. Utilizou-se revisão de literatura com descrição de um caso para elucidar a doença e sedimentar o conhecimento desta patologia As referências utilizadas foram selecionadas pela Plataforma PUBMED. OS DADOS foram OBTIDOS POR REVISÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE. Em relação aos aspectos éticos, foi ofertado à genitora do paciente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido , sendo posteriormente o trabalho foi aprovado Comitê de Ética e Pesquisa (CEP/UNIFESP) sob registro do CAAE 55563322.1.0000.5505. " Criança de 4 anos, sexo masculino, histórico de sibilância pós-viral, apresentando quadro de dispneia progressiva, sibilância e perda ponderal, necessitando de internação e sendo encaminhada para seguimento especializado na pneumologia pediátrica do Hospital São Paulo no qual foi detectado imagens radiológicas multicisticas difusamente em pulmões. Durante a internação foi realizado biópsia pulmonar a céu aberto, tendo confirmação anatomopatológica da Histiocitose de céulas de Langerhans. Após esta confirmação, paciente foi transferido para serviço de referência em Oncologia pediátrica para realização do tratamento desta patologia."A Histiocitose de Células de Langerhans caracteriza-se pela proliferação e acúmulo de células dendríticas mieloides em vários tecidos e órgãos Apresenta-se clinicamente com tosse seca; taquipneia; respiração superficial; dor torácica; sibilos; pneumotórax e sintomas constitucionais (mal estar, febre, perda de peso). Na faixa etária pediátrica está presente em cerca de 10% dos pacientes com acometimento multissitêmico, sendo muito raramente apresentado de forma isolada. Deve-se alertar aos profissionais de saúde para os casos de dispneia progressiva e sintomas sistêmicos e quando associado à imagens radiológicas multicisticas pulmonares, deve-se atentar para diagnóstico de histiocitose de célula de Langerhans