



17º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Pneumologia
Pediátrica**

100% PRESENCIAL

3 a 6 de agosto de 2022
~ Rio de Janeiro | RJ ~
Hotel Windsor Barra

Trabalhos Científicos

Título: Cisto Mediastinal: Um Achado Radiográfico Acidental-Relato De Caso

Autores: MYKA PALOMA ANTUNES FERREIRA MASCARENHAS (FACERES), ROBERTA COSTA PALMEIRA (FACERES), MYLENA NARUMI TAKAHASHI (FACERES), JÉSSICA TERRIBELE (FACERES), CAMILA MARIA MALNARCIC (FACERES), ELISA BOSQUIROLI BRANDALIZE (FACERES)

Resumo: O cisto broncogênico do mediastino é uma lesão benigna congênita. Geralmente assintomáticos com diagnóstico clínico ou achado incidental de radiografia, porém, quando há sinais e sintomas obstrutivos, podem ser confundidos com asma brônquica. "AVLS, masculino, 6 anos, apresentando tosse seca recorrente, desde 2 anos, com piora no último ano. Havia chiado no peito, dispnéia, tosse noturna, diurna e aos esforços. História pessoal de rinite alérgica. Relatava episódios de disfagia eventual com dieta sólida, foi investigado com seriografia esofágica que revelou lesão expansiva mediastinal com compressão ovalar na face lateral do terço distal do esôfago com hipótese diagnóstica de cisto broncogênico ou cisto de duplicação esofágica. Radiografia de tórax sem alterações, e radiografia de cavum com hipertrofia de adenóide. Tomografia computadorizada de tórax com característica de cisto broncogênico sem comunicação com a luz do esôfago. Após início de tratamento de asma e rinite alérgica, houve melhora dos sintomas e das crises. Realizada avaliação com cirurgião torácico com paciente assintomático optou-se por conduta expectante, com reavaliação periódica anual. ""O cisto broncogênico, embora raro, é a lesão cística, benigna, mais recorrente do mediastino, representando 6 a 15 % das massas dele. O seu tratamento inclui o procedimento cirúrgico, seja em pacientes sintomáticos ou assintomáticos."O relato descreveu um diagnóstico de cisto broncogênico com descoberta por meio de radiografia para investigação de um sintoma inespecífico como a tosse, que apresentou conduta expectante em vez de cirúrgico como acontece na maioria dos casos.