



17º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Pneumologia
Pediátrica**

100% PRESENCIAL

3 a 6 de agosto de 2022
~ Rio de Janeiro | RJ ~
Hotel Windsor Barra

Trabalhos Científicos

Título: Linfadenite Crônica Granulomatosa: Importância Do Diagnóstico Diferencial Na Infância

Autores: ADRIANA PAIVA DE MESQUITA (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS/ ESTÁCIO DE SÁ), ANDRÉ FILIPE DA FONSECA FREIND (ESTÁCIO DE SÁ), ARIANE MOLINARO VAZ DE SOUZA (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS/ ESTÁCIO DE SÁ), DEBORAH NUNES CHAGAS D'ARAÚJO (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS), REGINA CÉLIA DE SOUZA JESUS RANGEL (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS/ ESTÁCIO DE SÁ), THAIS SOARES DO NASCIMENTO (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS)

Resumo: Na criança, um grupo heterogêneo de doenças pode cursar com linfonodomegalias. Assim, as informações obtidas na anamnese e no exame físico são relevantes para orientar o diagnóstico, bem como os exames complementares. "Relatar o caso de um escolar com linfadenite cervical de evolução crônica encaminhado para investigação por suspeita de câncer, porém, com histórico de convívio com felinos e uma tia com tuberculose em tratamento irregular. ""G.E.C.A., masculino, 11 anos, apresenta adenomegalias cervicais e submandibulares, com evolução de cinco meses, associadas a lesões papulares, pruriginosas, localizadas em face. Febre baixa de poucos dias, sem comprometimento do estado geral. Negava tosse e emagrecimento. Tratado inicialmente com antibiótico, anti-histamínico e corticoide sistêmico, sem melhora. Bom estado geral, gânglios submandibulares e cervicais bilaterais com poucos sinais flogísticos, confluentes, elásticos e não aderidos a planos profundos. Restante do exame sem alterações. Hemograma com monocitose, TORCHS, anti HIV e pesquisa de Epstein-Barr, negativos. Ultrassonografia cervical (descrever gânglio), imagem de tórax (adenomegalia hilar à esquerda). Teste tuberculínico reator de 11mm (flictenular). Histopatológico compatível com linfadenite crônica granulomatosa e ausência de BAAR. Teste rápido molecular (TRM-TB) positivo e cultura negativa. Evoluiu com melhora completa após seis meses de tratamento. "O caso descrito demonstra a importância da abordagem organizada na criança com linfadenite crônica. A tuberculose ganglionar periférica é uma das causas infecciosas a serem aventadas, e seu diagnóstico etiológico na infância dependem do grau de suspeição. O reconhecimento precoce reduz morbimortalidade e evita sequelas graves.