



17º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Pneumologia
Pediátrica**

100% PRESENCIAL

3 a 6 de agosto de 2022
~ Rio de Janeiro | RJ ~
Hotel Windsor Barra

Trabalhos Científicos

Título: Tuberculose Grave Em Adolescente

Autores: GABRIELA ALBERNAZ CAMPOS (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS), MARIA BEATRIZ TAVARES CAMACHO PEREIRA (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS), ANA LETICIA FERNANDES COELHO DE OLIVEIRA (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS), LILIA MAIA SILVA (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS), ISABELA TEIXEIRA BRAGANÇA (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS), VITORIA SANTOS MALHEIROS DE ARAUJO (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS), THAIS SOARES DO NASCIMENTO (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS), ADRIANA PAIVA DE MESQUITA (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS), ANA LUCIA MICELI (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS), DANIELA RABELLO FRANCO (HOSPITAL MUNICIPAL JESUS)

Resumo: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*. Crianças e adolescentes com menos de 15 anos representam cerca de 11% de todas as pessoas com TB globalmente. Menos de 2% da população é acometida pela forma disseminada, que é apresentação incomum em imunocompetentes e define-se como lesão pulmonar aliada a um ou mais focos extrapulmonares ou mais de dois focos extrapulmonares associados. "O objetivo foi relatar o caso de um adolescente que evoluiu com forma grave da doença. VCM, 15 anos, masculino, com tosse persistente, febre, sudorese noturna e emagrecimento. Após 4 meses, procurou clínica da família, sendo iniciado empiricamente esquema RIPE, porém, interrompido após 4 dias devido a vômitos, febre e queda do estado geral. Procurou o serviço de emergência, sendo internado. Ao exame: Emagrecido e ausculta com murmúrio vesicular abolido em base esquerda. ""Teste tuberculínico de 15mm, escarro com baciloscopia negativa e TRM-TB detectável. Anti-HIV não reagente. Radiografia de tórax com derrame pleural parapneumônico à esquerda. Foi reiniciado esquema RIPE. Por persistência dos episódios de vômitos realizou tomografia de crânio que demonstrou tuberculomas e punção liquorica com ADA elevada, predomínio de mononucleares, aumento de proteínas e diminuição de glicose. Sendo introduzido o corticoide venoso. Evoluiu com melhora clínica e radiológica. "Desse modo, é de extrema importância a adoção de práticas profissionais que contemplem o diagnóstico e tratamento da TB, visando evitar que o atraso na procura dos serviços públicos bem como o baixo grau de suspeição, levem à desfechos desfavoráveis.