



18º CONGRESSO BRASILEIRO DE  
Gastroenterologia e  
Hepatologia Pediátricas  
4º CÓRGRESO BRASILEIRO DE  
Nutrologia Pediátrica  
1º SIMPÓSIO DE  
Suprimento Nutricional  
em Pediatria



## Trabalhos Científicos

**Título:** Análise Do Aleitamento Materno Em Lactentes Menores De Seis Meses Com Sangramento Retal

**Autores:** MARILIA AGRA NORMANDE (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), LARISSA CARVALHO CASER (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), LYDIA DE SOUZA LIMA LAUAND (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), JOBERT KAIKY SILVA NEVES (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), ISABELLA VALADARES DE OLIVEIRA (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), AMANDA SILVA NASCIMENTO (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), MAURO SERGIO TOPOROVSKI (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), CLARICE BLAJ NEUFELD (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO)

**Resumo:** **OBJETIVO:** Determinar as etiologias do sangramento retal em uma coorte de recém-nascidos e lactentes até seis meses de idade, correlacionando com as características do aleitamento materno (AM). **MÉTODOS:** Estudo observacional, longitudinal e retrospectivo, que selecionou lactentes de até seis meses com queixa de sangramento retal, entre 2017- 2021. Foi realizado teste de provação oral (TPO) para confirmação do diagnóstico de alergia a proteína do leite de vaca (APLV), e, posteriormente, os lactentes foram divididos em dois grupos: o da proctocolite alérgica (PA), e outro englobando outras etiologias, incluindo sangramento idiopático. Após, avaliadas as características do AM. **RESULTADOS:** Analisamos 76 crianças menores de seis meses com sangramento retal. Após TPO, 43 crianças (56,6%) foram diagnosticadas com PA e 33 crianças (43,4%) incluídas no grupo de outras causas de sangramento retal. A idade média no início do sintoma foi de 57,7 dias, sendo a prevalência de aleitamento materno exclusivo (AMEX) nessa idade de apenas 28,9% dos lactentes. A duração média de AMEX foi de 51,7 dias, sendo 54,6 dias no grupo da PA e 48 dias nos outros diagnósticos. Apenas 11 crianças (14,4%) receberam AMEX até seis meses, sendo 5 crianças com PA e 6 crianças com sangramento por outras causas. Dentre os 76 pacientes, 60 tiveram algum consumo de fórmula antes dos seis meses, sendo que as indicações foram médicas em 41 desses casos, principalmente por internação em UTI neonatal e prematuridade. 5 pacientes com diagnóstico final de APLV realizaram mudança no regime de AM, em sua maioria por persistência do sangramento mesmo com a dieta de exclusão materna. **DISCUSSÃO:** Qualquer seja a causa do sangramento retal nos lactentes, caso não haja contraindicação absoluta, é recomendada a manutenção do aleitamento materno até os seis meses de idade. Desta forma, é importante continuar com políticas de estímulo do AM, seja pelo pediatra geral ou Gastropediatra.