



Trabalhos Científicos

Título: O Diagnóstico Tardio De Aply E Suas Consequências No Bem-Estar

Autores: LUCIANA MARIA CARMONA MENDES (UNIFRAN), NATHÁLIA GUEDES CARRIJO (UNIFRAN), THAIS MARTINS OLIVEIRA (UNIFRAN)

Resumo: INTRODUÇÃO: A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é a reação adversa a alimentos mais comum da infância, sendo mais prevalente durante o primeiro ano de vida. Constitui-se de sintomatologia variada, abrangendo desde sintomas gastrintestinais a até mesmo manifestações respiratórias, dermatológicas, cardiovasculares e neurológicas. Trata-se, portanto, de um diagnóstico complexo. DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente do sexo feminino com diagnóstico tardio de APLV. A história clínica se inicia desde os primeiros meses de vida, onde apresentou quadro de irritabilidade com várias idas ao Pronto Socorro infantil, tendo como diagnóstico cólica. Ao decorrer do tempo, apresentou quadros de otite e pneumonia recorrentes, sendo necessário internação hospitalar. Mesmo após alta, continuou a apresentar infecções respiratórias de repetição e manifestações dermatológicas. Após aquisição da linguagem, paciente começou a queixar-se de dores abdominais, diminuindo a ingesta, resultando numa perda ponderal importante. Apresentava a mesma queixa após a ingestão de medicamentos contendo leite em sua composição, piorando a sintomatologia. A reversão do quadro aconteceu após consulta com gastroenterologista, aos 2 anos de idade, na qual realizou o diagnóstico de APLV, orientando quanto à mudança da dieta e com a introdução da soja. DISCUSSÃO: Este relato aponta os prejuízos da APLV na saúde e bem-estar de uma criança que apresentou sintomas predominantemente respiratórios e dermatológicos. Dessarte, é importante que o pediatra suspeite de um caso não só quando a criança apresenta os sintomas mais comuns, como as manifestações gastrintestinais, mas tenha em mente que se trata de uma doença que interfere em diversos aparelhos, apresentando sintomatologia variada. CONCLUSÃO: Enfatiza a grande melhora com remissão dos sintomas frente ao diagnóstico correto associado a necessidade de uma detecção rápida, visando redução de possíveis complicações e garantindo o bem-estar da criança e dos responsáveis, resultando em uma melhor qualidade de vida.