



Trabalhos Científicos

Título: Pioderma Gangrenoso Como Manifestação Extraintestinal Na Colite Ulcerativa Pediátrica

Autores: JÉSSICA MENEZES NOVAIS (HUPES/BA), ANA LUIZA TRIPODI DE FARIA LOPES (HUPES/BA), MARINA LORENA DE ANDRADE OMENA (HUPES/BA), FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO (HUPES/BA), CARLA REBOUÇAS NASCIMENTO (HUPES/BA), CIBELE DANTAS FERREIRA MARQUES (HUPES/BA), TAINARA QUEIROZ OLIVEIRA (HUPES/BA), DANIELA LIMA DE OLIVEIRA SAAVEDRA (HUPES/BA), QUÉZIA JULIANA SOUZA MOREIRA (HUPES/BA), MICHELLE CAIRES CACIQUE (HUPES/BA)

Resumo: INTRODUÇÃO A Colite Ulcerativa (CU) é uma doença crônica, multifatorial, caracterizada pela interação de fatores genéticos, imunológicos, ambientais e da microbiota intestinal. Em crianças costuma ser mais extensa, apresentar maior grave, mais complicações e repercussões clínicas em comparação com os adultos. DESCRIÇÃO DO CASO L.J.S., 14 anos, feminino, internada em hospital terciário para investigar diarreia sanguinolenta e dor abdominal iniciada há 18 meses. Referia associado ao quadro gastrointestinal, anorexia, perda ponderal e surgimento há quatro meses de lesões ulceradas, dolorosas, com superfície crostosa em região pré-tibial bilateral, de grande extensão (18x7cm). Apresentava comprometimento nutricional – desnutrição energético-proteica moderada, magreza e sarcopenia, laboratorialmente exames evidenciavam anemia, plaquetose e hipoalbuminemia. Submetida a colonoscopia, sugerindo CU - colite extensa acometendo todos os segmentos colônicos e o reto – score MAYO 3, confirmado com anatomopatológico. Realizou biópsia de pele, sugestiva de pioderma gangrenoso (PG). Iniciada terapia com imunobiológico anti-TNF – Infliximabe, associado à imunossupressão com Azatioprina. Apresentou boas respostas: cicatrização completa do pioderma gangrenoso, recuperação nutricional e remissão clínica e bioquímica da CU. DISCUSSÃO A CU pode acometer todo o cólon e o reto, provocar repercussões sistêmicas, como déficit nutricional, pômbero-estatural e anemia, além de causar manifestações extraintestinais (MEIs), que podem atingir sistema cutâneo, musculoesquelético, óptico e hepatobiliar. O Pioderma Gangrenoso é a manifestação extraintestinal cutânea mais grave e debilitante da CU, é rara e aumenta a mortalidade nos acometidos. Os pacientes com PG e CU são mais propensos a necessitar de terapia imunossupressora para remissão dos sintomas, sendo o anti-TNF frequentemente utilizado, com altas taxas de sucesso terapêutico. CONCLUSÃO O diagnóstico precoce da CU, atentando às suas diversas manifestações e o estabelecimento de um tratamento adequado e imediato é de extrema importância, afim de prevenir complicações, reduzir mortalidade e manter uma boa qualidade de vida.