



## Trabalhos Científicos

**Título:** Pólipo Harmartomatoso Juvenil: Uma Causa De Vômitos Recorrentes

**Autores:** AMANDA NASCIMENTO (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO PAULO), JOBÊT NEVES (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO PAULO), ISABELLA VALADARES (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO PAULO), MARILIA NORMANDE (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO PAULO), LYGIA LAUAND (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO PAULO), CLARICE NAUFALD (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO PAULO), MAURO SERGIO TOPOROVSKI (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO PAULO)

**Resumo:** Relato de caso clínico Introdução Paciente com vômitos recorrentes muitas vezes são diagnosticados como portadores de síndrome de vômitos cíclicos. Porém, existem diagnósticos diferenciais com prognósticos variáveis que precisam ser afastados em determinados cenários clínicos. Descrição do caso Paciente sexo masculino 6 anos de idade, natural e procedente da cidade de Santo Andre-SP, procura atendimento em um pronto socorro infantil com queixa de vômitos intermitentes há dois meses, associado a dor abdominal difusa. Foi aventado a hipótese de vômitos cíclicos e iniciado tratamento direcionado. Retorna 15 dias depois com permanência da queixa e relato de perda de 5 Kgs. No exame físico apresentava desidratação e distensão abdominal. Recebeu expansão volêmica, solicitado exames laboratoriais e tomografia de abdome com contraste. Paciente foi internado para melhor elucidação do caso. Exames laboratoriais e outros exames complementares como endoscopia digestiva alta e avaliação de trânsito intestinal, vieram normais. Em tomografia de abdome foi identificado imagem que realça ao contraste em flanco esquerdo, região retroperitoneal, sem ultrapassar linha média. Paciente foi submetido a videolaparoscopia que evoluiu para laparotomia exploradora. Realizada enterectomia a 70cm do ângulo de Treitz e reiterada lesão vegetante intraluminal. Em análise anatomopatológica visto pólipo harmartomatoso juvenil. Após retirada de pólipo paciente segue em acompanhamento ambulatorial, sem novos episódios de vômitos e em recuperação de ganho ponderal. Discussão: Vômito pode ocorrer devido causas infecciosas, neurológicas, endocrinológicas. Quando se torna recorrente, um dos diagnósticos diferenciais e que foi atribuído ao caso é de vômitos cíclicos. Porém muitas vezes exames de imagem são necessários para excluir causas como tumores semi-obstrutivos e massas que possam causar intussuscepção, e que ocasionem vômito. Conclusão Vômitos são causas frequentes, deve-se atentar a sinais de alarme e recorrência da queixa para maior maior investigação com exames de imagem.