



Trabalhos Científicos

Título: Distúrbios Gastrointestinais Em Crianças Com Transtorno De Espectro Autista

Autores: JADE DE BRITO FREIRE MONTEIRO ALVES (UFPI), ANGÉLICA MARIA ASSUNÇÃO DA PONTE LOPES (UFPI), CAROLINE NOGUEIRA PARANHOS (UNIFACID), NÁIRA JULIETA ALVES DA FONSECA (UFCG), YAGO REIS DE DEUS BARROS (UNINOVAFAPI), ANA REGINA MACHADO NUNES (UNIFACID), HILDENISE SÁRVIA DE SOUSA ALMEIDA (UFPI), VÍTOR ASSUNÇÃO DA PONTE LOPES (ESCS), JOSUÉ ASSUNÇÃO DA PONTE LOPES (UNIFACID), ROBERTA ORIANA ASSUNÇÃO SOUSA DA PONTE LOPES (UNIFACID)

Resumo: Objetivo: Avaliar a prevalência de distúrbios gastrointestinais em pacientes com transtorno do espectro autista (TEA) atendidos em ambulatórios de neuropediatria na cidade de Teresina-Piauí. Bem como, identificar o sexo mais acometido, os sintomas gastrointestinais mais comuns e a frequência de seletividade alimentar e compulsão alimentar nesses pacientes. Métodos: Estudo observacional descritivo, documental de caráter analítico, realizado através da análise de 300 prontuários entre Janeiro de 2019 e Outubro de 2019. Incluídos pacientes com até 19 anos incompletos e com diagnóstico firmado de TEA. Excluídos os pacientes com outras síndromes ou doenças associadas. Resultados: 40 prontuários atenderam aos critérios. A maioria dos pacientes avaliados foi do sexo masculino, representando 82,5%. Constatou-se que 15% dos pacientes com TEA tinham diagnóstico de alguma patologia gastrointestinal, sendo a constipação crônica funcional a mais prevalente (60%), seguida da intolerância à lactose (40%) e da doença do refluxo gastroesofágico (20%). Os sintomas gastrointestinais estavam presentes em até 57,5% dos pacientes. Destes, o mais comum foi a presença de fezes ressecadas em 85% dos casos, seguido de dificuldade/dor para evacuar (60%), comportamento de retenção (60%), distensão abdominal (15%) e menos de 3 evacuações na semana (15%). A seletividade alimentar estava presente em 62,5% dos pacientes com TEA e a compulsão alimentar, apenas em 2,5%. Conclusão: A constipação crônica funcional foi a mais prevalente das patologias gastrointestinais nos pacientes autistas, seguida da intolerância à lactose e da doença do refluxo gastroesofágico. Fezes ressecadas e dificuldade/dor para evacuar foram os sintomas gastrointestinais mais prevalentes nos pacientes estudados e a presença de seletividade alimentar foi predominante, enquanto que a compulsão alimentar esteve pouco presente.