



Trabalhos Científicos

Título: Constipação E Desnutrição Crônica Em Adolescente De 15 Anos Com O Diagnóstico De Doença De Crohn

Autores: LUIZA LORENZONI GRILLO (UFES/HUCAM), MARIANNA OLIVEIRA REIS (UFES/HUCAM), ANTÔNIA BULHÕES NAEGELE DE ALMEIDA (UFES/HUCAM), ANDRÉ FELIPE MONTEIRO GONÇALVES (UFES/HUCAM), LUÍZA ROCHA VICENTE PEREIRA (UFES/HUCAM), ANA DANIELA IZOTON DE SADOVSKY (UFES/HUCAM), ROBERTA PARANHOS FRAGOSO (UFES/HUCAM)

Resumo: Introdução: 8232, Cerca de 25 a 30% dos pacientes acometidos com Doença Inflamatória Intestinal (DII) iniciam seus sintomas antes dos 20 anos de idade. A Doença de Crohn (DC), na população pediátrica pode desencadear quadros iniciais mais graves, com importante comprometimento nutricional. Descrição do caso: TCG, masculino, 15 anos. Foi internado, em 2018, com perda de 11 quilos em 5 meses, constipação crônica, dor abdominal, dor à evacuação. Ao exame físico, apresentava fissuras e dois plicomas anais. Foram prescritos Polietililglicol 4000 e Amtriptilina 25mg diários, com melhora parcial das queixas. Realizou Endoscopia Digestiva Alta, com o resultado de gastrite erosiva plana elevada moderada em antro e úlcera duodenal, na época orientada a investigação para DC, entretanto negativa da família para realização de colonoscopia com perda de seguimento. Em 2020, retorna à consulta com diarreia, hiporexia, perda ponderal e febre. A colonoscopia mostrou lesões ulceradas no cólon, e a histologia indicou ileíte crônica inespecífica leve, colite crônica intensa ativa ulcerada e retite crônica leve e inespecífica, definindo o diagnóstico de DC. Tentada a indução com nutrição enteral exclusiva, todavia não tolerou. Realizou tratamento de tuberculose latente com Isoniazida 200mg durante 9 meses devido PPD reativo, após 30 dias do início dessa medicação, começou terapia com imunobiológico e imunomodulador. Houve resposta clínica e retomada do crescimento com ganho de peso e altura. Discussão: Apesar da variabilidade de manifestações na DC, o quadro clínico mais comum cursa com dor abdominal, diarreia e perda ponderal. No entanto, deve-se atentar à constipação intestinal e desnutrição como achados importantes para investigação precoce da DII, a fim de proporcionar melhor prognóstico aos pacientes. Conclusão: É importante pensar no diagnóstico de DC em crianças com constipação de difícil controle e desnutrição. O diagnóstico precoce pode diminuir complicações intestinais graves, danos nutricionais e o comprometimento final da estatura nesses pacientes.