

6 a 9 de abril de 2022
Centro de Convenções
de Goiânia



18º CONGRESSO BRASILEIRO DE
Gastroenterologia e
Hepatologia Pediátricas
4º CONGRESSO BRASILEIRO DE
Nutrologia Pediátrica
1º SIMPÓSIO DE
Suporte Nutricional
em Pediatria



Sociedade
Brasileira
de pediatria

Trabalhos Científicos

Título: Avaliação De Crianças De 0 A 2 Anos De Idade Após Teste De Desencadeamento Oral Aberto.

Autores: MARIA EDUARDA MAGNO GONÇALVES (FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE), LARISSA CANO COSTA BARROS (FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE), REGINA NASCIMENTO GAMA (FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE), MARINA MORAIS MARTINS DE LUCENA (FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE), MICHELA CYNTHIA DA ROCHA MARMO (INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP)

Resumo: Objetivo: avaliar as reações apresentadas pelos pacientes com diagnóstico de alergia alimentar não-IgE e IgE mediada durante o teste de desencadeamento oral aberto (TDOA) no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP. Métodos: é um estudo retrospectivo tipo corte transversal, realizado com crianças de 0 a 2 anos atendidos no ambulatório de gastroenterologia pediátrica no período de 2018 a 2019 no IMIP. Realizada avaliação através do estudo do prontuário e das fichas preenchidas durante o TDOA desses pacientes. Resultados: Foram avaliadas 243 crianças, onde 71,60% tiveram diagnóstico de APLV não IgE mediada, 23,86% dos pacientes positivaram no TDOA, 37,03% tiveram sangue nas fezes como sintoma inicial, 25,92% realizaram dosagem de IgE, sendo 85,29% deste alterados. 23,86% tiveram TDOA positivo, sendo a diarreia o sintoma mais prevalente em 9,87% seguido por urticária em 8,64%. Não ocorreram reações do tipo choque anafilático durante o TDOA. Conclusão: O TDOA é o método de escolha para diagnóstico de alergias alimentares. A realização deste teste ambulatorialmente é seguro, colabora para o acompanhamento dos pacientes ambulatoriamente e evita ocupações hospitalares desnecessárias.