

6 a 9 de abril de 2022
Centro de Convenções
de Goiânia



18º CONGRESSO BRASILEIRO DE
Gastroenterologia e
Hepatologia Pediátricas
4º CONGRESSO BRASILEIRO DE
Nutrologia Pediátrica
1º SIMPÓSIO DE
Suporte Nutricional
em Pediatria



Trabalhos Científicos

Título: Análise Do Estado Nutricional E Fatores De Risco Em Pacientes Pediátricos Com Ostomia Intestinal Atendidos Em Unidade De Referência No Distrito Federal

Autores: LARISSA CAETANO SILVA (HMIB), MARCELLA LEONA PINHEIRO MADARIAGA (HMIB), ADRIANA HAACK (HMIB), LÍVIA GURGEL DINIZ (HMIB), ALINE MELO NASCIMENTO HORINO (HMIB)

Resumo: Objetivo: Avaliar o estado nutricional, o consumo alimentar e os fatores de risco nutricionais, clínicos e sociais de pacientes pediátricos estomizados atendidos ambulatorialmente em hospital terciário. Metodologia: Estudo transversal analítico, realizado com crianças estomizadas, de ambos os sexos, menores de 10 anos de idade. Foi realizado diagnóstico do estado nutricional, utilizando diversos instrumentos de avaliação nutricional, e avaliado consumo alimentar. Resultados: No total compareceram 24 crianças com a idade média de 10,29 anos. A ostomia mais encontrada foi a colostomia (54%), sendo anomalia anorretal o motivo mais frequente para a confecção do estoma. Foram encontradas frequências elevadas de déficits nutricionais. A associação entre o estado nutricional e o motivo da confecção do estoma apresentou significância estatística ($p=0.036$), levando à inferência de que a causa de base para confecção do estoma pode levar a um comprometimento do estado nutricional. Foram encontradas frequências elevadas de déficits nutricionais, uma vez que parte das crianças se encontraram abaixo da linha da magreza. A maioria dos pacientes fazem uso de fórmulas infantis, sendo as mais consumidas as fórmulas infantis especializadas. Foi possível observar um alto consumo de alimentos ultraprocessados nas crianças que já iniciaram a alimentação com sólidos. Conclusão: Foi encontrada alta prevalência de déficits nutricionais nas crianças estomizadas. A colostomia foi a localização do estoma mais encontrada entre as crianças, tendo como motivo mais frequente para a confecção do estoma a anomalia anorretal. A causa de base para confecção da ostomia pode levar a um comprometimento do estado nutricional.