



18º CONGRESSO BRASILEIRO DE  
**Pneumologia  
Pediátrica**  
Porto Alegre - RS

**10, 11 E 12 DE  
ABRIL DE 2025**

Centro de Eventos da PUCRS  
Av. Ipiranga, 6681 - Partenon, Porto Alegre - RS



## Trabalhos Científicos

**Título:** Displasia Broncopulmonar E Amamentação Exclusiva Na Alta Hospitalar: Aspectos Investigados Em Prematuros

**Autores:** MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO PESSOA DE SANTANA (UNCISAL E HUPAA/UFAL/EBSERH), STEFANE CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA (UFPE), MARIA EDUARDA DE AZEVEDO FERRO CARDOSO (HUPAA/UFAL/EBSERH), MARIA ISABELE CARNEIRO PESSOA DE SANTANA (CESMAC), RENATO MARTINS PEDROSA (CESMAC), KATHARINA VIDAL DE NEGREIROS MOURA (HUPAA/UFAL/EBSERH), ANA MARIA CAVALCANTE MELO (HUPAA/UFAL/EBSERH)

**Resumo:** Prematuros estão sujeitos a receber alta hospitalar com diferentes formas de alimentação, sendo o aleitamento materno exclusivo considerado padrão ouro para o desenvolvimento. Porém, trata-se de um desafio quando as particularidades estão relacionadas às condições clínicas do prematuro com displasia broncopulmonar. "Investigar aspectos relacionados ao estabelecimento do aleitamento materno exclusivo em recém-nascidos prematuros com displasia broncopulmonar. "Estudo transversal realizado num hospital do Nordeste do Brasil, com população constituída de prematuros com diagnóstico de displasia broncopulmonar, que receberam alta hospitalar no período de junho de 2022 a junho de 2023. Critérios de exclusão: comprometimento neurológico, malformações congênitas, doenças cardíacas, síndromes ou patologias que comprometam as funções e integridade do sistema sensorio motor oral. Coleta de dados ocorreu com utilização de um formulário semiestruturado. Análise estatística realizada através de um estudo de prevalência por percentual, com objetivo de obter maior taxa na forma de alimentação aleitamento materno exclusivo, na alta hospitalar. Para reconhecimento da correlação das variáveis com a prevalência da forma de alimentação, foi realizada uma comparação efetuada pelo Software BioEstat 5.0, utilizando-se o teste estatístico Qui-quadrado. Foi considerado significativo um valor de  $p < 0,05$ . Para avaliação das variáveis categóricas, foram calculadas as frequências percentuais e construídas as respectivas distribuições de frequência. Para as variáveis contínuas, foram calculadas as medidas de tendência central (média e desvio padrão). "Dos 143 prematuros que receberam alta hospitalar, 26 atenderam aos critérios de inclusão; 18 (69,2%) do sexo feminino, 3 (11,5%) gemelares e 14 (53,8%) prematuros extremos e extremo baixo peso, com idade gestacional média de 30,2 semanas. O tempo médio de internação foi de 11 dias. A prevalência de aleitamento materno exclusivo foi de 57,6%. As variáveis que se mostraram significantes estatisticamente foram: nutrição enteral através de sonda nasogástrica a partir de 32 semanas de idade corrigida e média de peso 1,450g, transição da nutrição enteral para via oral através da técnica sonda-peito, não utilização de bicos sintéticos, atuação fonoaudiológica diariamente, formato de atuação em equipe interprofissional para tomadas de decisões e participação ativa da mãe nos cuidados do recém-nascido, no âmbito do Método Canguru. As variáveis idade materna, tipo de parto, sexo, peso ao nascer, experiência de amamentação, transição no método respiratório e sucção não nutritiva eliciada facilmente não demonstraram significância para a forma de alimentação investigada na alta hospitalar. "O estabelecimento do aleitamento materno exclusivo foi possível na maioria dos prematuros com displasia broncopulmonar, destacando-se aspectos identificados nesta pesquisa. Recomenda-se a realização de mais pesquisas com outros desenhos metodológicos.