



18º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Pneumologia
Pediátrica**
Porto Alegre-RS

**10, 11 E 12 DE
ABRIL DE 2025**

Centro de Eventos da PUCRS
Av. Ipiranga, 6681 - Partenon, Porto Alegre - RS



Trabalhos Científicos

Título: O Uso De Corticoide Sistêmico Em Pacientes Atendidos Em Um Ambulatório De Pneumologia Pediátrica Em Pelotas/rs

Autores: CAROLINA BALLESTER LOPES (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA), RAPHAEL BRONZATO WINK (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA), 8288,ALESSANDRA YUTANI KUROIWA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA), JADE RIES GIRARDI (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA), ANA CAROLINA PORTZ (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA), SOLANGE MENDES VIEIRA (HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO), CÍNTIA KANAZAWA SILVEIRA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA), KAREN GRUHN (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), RENATA FIUZA STRELOW (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), ALINE LEVIS SOARES (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), 8288,MAÍSE XIMENES BOCACIO (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS, PELOTAS), 8288,KARINA DIAS LOPES SOARES (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), KANANDA SCHNEIDER DOS SANTOS (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA), PEDRO HENRIQUE VARRASCHIN DA SILVA (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), MARCOS VINÍCIOS RAZERA (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA)

Resumo: "Avaliar o uso de corticoide sistêmico nos três meses anteriores à consulta de pacientes atendidos em um ambulatório de pneumologia pediátrica." Estudo observacional descritivo de dados de prontuários médicos de pacientes atendidos em um ambulatório de pneumologia pediátrica no ano de 2023 no Rio Grande do Sul. Trabalho vinculado a projeto aprovado pelo Comitê de Ética sob número CAAE 71369023.4.0000.5339. "Foram analisados 93 prontuários, correspondendo à totalidade dos pacientes atendidos no período. Apenas 26 (27,9%) prontuários possuíam a informação sobre o uso de corticoide oral nos 3 meses anteriores à consulta. Destes, 11 (42,3%) descreveram o uso dessa classe de medicação: 6 (54,5%) por crise de asma, 3 (27,3%) sem indicação médica específica, 1 (9,1%) por pneumonia e 1 (9,1%) por resfriado." Ao considerar apenas os prontuários com a informação em estudo, conclui-se que percentual significativo dos pacientes atendidos fez uso de corticoide oral nos três meses anteriores à consulta e, infelizmente, muitos deles fizeram uso inadequado da medicação. Sabe-se que o uso de corticoide sistêmico é indicado para casos de exacerbação da asma, exceto as consideradas leves. A medicação deve ser administrada imediatamente, idealmente até uma hora do início dos sintomas, especialmente se o paciente não estiver apresentando sinais de melhora com remédios de resgate inalatório. É imprescindível que os pacientes ou responsáveis sejam avisados sobre os efeitos colaterais comuns em curto prazo, incluindo aumento do apetite, distúrbios do sono, refluxo e alterações do humor. Por isso, é importante que os responsáveis restrinjam o uso somente após indicação médica, diferente do que foi observado nos dados coletados