



18º CONGRESSO BRASILEIRO DE
**Pneumologia
Pediátrica**
Porto Alegre - RS

**10, 11 E 12 DE
ABRIL DE 2025**

Centro de Eventos da PUCRS
Av. Ipiranga, 6681 - Partenon, Porto Alegre - RS



Trabalhos Científicos

Título: Pneumonia Adquirida Na Comunidade Associada A Derrame Pleural E Pneumatocele Gigante: Um Relato De Caso Na Pediatria

Autores: THAMMY DE LIMA BASTOS ROSA (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ), ANA PAULA MACHADO FRIZZO (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ), STELLA MOTTA RANZATO (UNIG - CAMPUS V), LUIZA RAMOS KELLY LESSA (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ), LORENA DE FREITAS GOTTARDI (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ), TARCÍLIO MACHADO PIMENTEL (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ), JÉSSICA DE ABREU ARRUDA (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ), KAMILA CAMPOS CABRAL (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ), ANDREYNA GOMES DE SOUZA (UNIG - CAMPUS V), GUILHERME SOARES VELOSO (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ), FÁBIO AMARAL RAMOS (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ)

Resumo: A Pneumonia adquirida na comunidade é uma doença infecciosa que possui diversas complicações possíveis, entre elas o derrame pleural e a pneumatocele. A evolução para derrame pleural se mostra mais frequente, ocorrendo em cerca de 27% dos casos, já a pneumatocele é mais rara, aparecendo em torno de 2-8% das pneumonias adquiridas na comunidade. "O artigo descreve um lactente de 9 meses, sexo masculino, diagnosticado em 2024 com pneumonia adquirida na comunidade, que evolui com derrame pleural e, posteriormente, uma pneumatocele gigante com grande risco de romper e fazer um pneumotórax. Optou-se pelo tratamento do derrame pleural com drenagem torácica em selo d'água e pela intervenção cirúrgica para drenagem da pneumatocele, devido ao insucesso da terapia conservadora. Após alguns dias com o dreno, houve melhora clínica e radiológica, evoluindo para alta hospitalar." A pneumatocele advinda da pneumonia é uma complicação rara, geralmente diagnosticada após alguns dias de internação, de acordo com o agravamento do quadro clínico do paciente, e confirmado com exames complementares de imagem. Apesar de alguns casos de resolverem espontaneamente, podem ser necessários tratamentos com intervenções maiores como a drenagem ou ressecção cirúrgica. É de extrema importância a atenção dos profissionais de saúde aos pacientes diagnosticados com pneumonia adquirida na comunidade, assim como sua evolução clínica e a resposta aos tratamentos instituídos, de modo a reduzir a chance de complicações e intervir precocemente quando ocorrerem.