



05 A 07 DE
JUNHO DE 2024

Centro de Convenções Senac
Rua do Passeio, 495 – Centro – São Luís – MA, 65015-350



Trabalhos Científicos

Título: Ni769,veis De Hemoglobina, Ferro E Ferritina Em Lactentes Atendidos Em Uma Unidade Ba769,sica De Sau769,de De Cidade Do Interior De São Paulo

Autores: TATIANA SHIRATSU (PUC-SP), CYNTHIA WATANABE (PUC-SP), DANIELE RAGUZA (PUC-SP), CAMILA ARANTES DE CICCIO (PUC-SP), KATIA SCANAGATTA (PUC-SP), VALQUIRIA NEVES PERIN (PUC-SP), ANA CLAUDIA ROSSINI CLEMENTINO (PUC-SP)

Resumo: A anemia pode ser definida segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) como a concentração de hemoglobina inferior a dois desvios padrões do limite de normalidade de acordo com a faixa etária, tornando-se insuficiente para atender as necessidades fisiológicas. A sua principal causa é a deficiência de ferro – distúrbio de micronutriente mais prevalente no mundo, principalmente em países em desenvolvimento. "Correlacionar a incidência de anemia ferropriva e padrão de alimentação com os níveis de hemoglobina aos três, seis e doze meses de idade de lactentes atendidos em uma Unidade Básica de Saúde do interior do estado de São Paulo. "Estudo longitudinal quali-quantitativo de avaliação dos níveis de hemoglobina através da coleta de amostras de gota de sangue (obtida por micropunção da região lateral do hálux, interpretada pelo aparelho HEMOCUE®), de lactentes nascidos a termo, adequados para idade gestacional, sem intercorrências neonatais, entre três e doze meses de idade, atendidos em uma unidade básica de saúde do interior de São Paulo, entre 2022 e julho de 2023." Aos 3 meses de idade, foram coletados exames de 40 lactentes, 75% (30/40) encontravam-se em aleitamento materno exclusivo; 67,5% (27/40) diagnosticados com anemia, sendo que deste total, 25,9% (7/27) apresentaram desmame precoce. 22 lactentes participaram aos seis meses de idade, apenas 27,2% (6/22) estavam em aleitamento materno exclusivo; 72,7% (16/22) realizavam a profilaxia com sulfato ferroso adequadamente; incidência de 40,9% (9/22) de anemia, sendo que deste total, 66,6% (6/9) apresentaram desmame precoce. Com um ano de idade, apenas 13 crianças participaram da coleta, com incidência de 15,3% de anemia (2/13), e 100% destes diagnosticados com anemia não realizaram profilaxia adequada com sulfato ferroso e também apresentaram desmame precoce. "É notório que se invista em prevenção na atenção básica, de modo a promover a disseminação do conhecimento em relação à anemia, bem como da importância do aleitamento materno e da suplementação de ferro para profilaxia de anemia ferropriva.