



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE
Gastroenterologia e
Hepatologia Pediátricas
19º CONGRESSO BRASILEIRO DE
Nutrologia Pediátrica
2º SIMPÓSIO DE
Suporte Nutricional
Pediátrico
São Luís - MA

05 A 07 DE
JUNHO DE 2024

Centro de Convenções Senac
Rua do Passeio, 495 - Centro - São Luís - MA, 65015-350



Trabalhos Científicos

Título: Perfil Epidemiológico E Clínico De Pacientes Com Doença Inflamatória Intestinal Em Acompanhamento Em Hospital Pediátrico De Referência

Autores: VITÓRIA JORGE CENCI (HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO), CAMILA DA ROSA WITECK (HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO), NILZA MARIA MEDEIROS PERIN (HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO), MARILISA BALDISSERA (HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO), ANA CAROLINA CARNEIRO MARCON (HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO)

Resumo: "Colite Ulcerativa e Doença de Crohn são doenças inflamatórias intestinais de causa multifatorial e com incidência em ascensão na infância. Sendo assim, O reconhecimento de nuances dos aspectos clínicos e epidemiológicos no diagnóstico dos pacientes atendidos no serviço de referência em gastroenterologia pediátrica gerará melhoria no atendimento destes e de futuros pacientes." "Estudo retrospectivo e descritivo onde foram analisados os prontuários de 77 pacientes, sendo que 58 preencheram critérios de inclusão no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2023. As variáveis analisadas foram: sexo, idade do início dos sintomas, idade no momento do diagnóstico, sintomas no diagnóstico, classificação da doença inflamatória intestinal e tratamentos instituídos." "Das 58 crianças estudadas, 53,45% são do sexo masculino. A idade do início dos sintomas variou de 6 meses a 14 anos, com média da idade do diagnóstico geral de 8 anos, sendo que 13 pacientes foram diagnosticados antes de completar seis anos de idade. O período entre o início dos sintomas e o diagnóstico foi superior a um ano em 22,4 % dos casos. Os sintomas mais prevalentes encontrados foram diarreia em 84,48% (51), seguido de dor abdominal com 81,03% (49) e sangramento nas fezes em 79,31% (46) dos pacientes. O sintoma de vômitos foi presente em 28 pacientes (48,28%), febre em 36,21% (21) e constipação ocorreu em 10 pacientes, e 36 pacientes tiveram perda de peso (62,07%). O envolvimento articular foi a manifestação extraintestinal mais frequente, com artralgia em 37,93%. Anemia presente em 68,97% dos pacientes ao diagnóstico. O uso de corticoide como terapia inicial foi necessária em 72,41% dos pacientes, em três casos a terapia imunobiológica foi necessária como terapia inicial, sendo infliximabe o imunobiológico escolhido, todos com diagnóstico de doença de Crohn." "Os sintomas prevalentes da doença inflamatória intestinal como diarreia, dor abdominal e sangramento nas fezes, estão alinhados com a frequência esperada nos estudos pediátricos. No entanto, é importante destacar que sintomas inespecíficos, como febre, vômitos, perda de peso, anemia e artralgia também podem ocorrer e devem ser considerados na avaliação clínica desses pacientes."