



Trabalhos Científicos

Título: Estado Nutricional De Adolescentes Atendidos Na Atenção Básica Do Sistema Único De Saúde Entre Os Anos De 2001 E 2007 No Estado Do Pará E No Brasil.

Autores: JESSICA LORENA ALVES (UFPA/SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ); MARILIA CUNHA BOTELHO ALVES (UFPA/SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ); JULIANA PASTANA RAMOS (UFPA/SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ)

Resumo: Objetivos: Analisar o perfil nutricional, através do percentil de peso por idade, dos adolescentes atendidos na Atenção Básica do SUS nos anos de 2001 a 2007. Metodologia: Avaliou-se dados referentes ao Percentil de peso por idade de adolescentes de 10 a 20 anos de idade atendidos pela Atenção Básica do SUS no período de 2001 a 2007. Os dados estão disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde e encontram-se categorizados em 3 intervalos de Percentis de peso pra idade. Neste estudo o estado nutricional foi avaliado de acordo com o gênero dos pacientes. Resultados: Tanto no Pará como no Brasil quase 70% dos usuários avaliados eram do gênero feminino. O estado nutricional dos pacientes analisados no Pará concorda com o do Brasil, visto que em ambos, cerca de 80% dos adolescentes são classificados como eutróficos, e menos de 10% está abaixo do peso ideal para idade. De acordo com o Teste T, o gênero não influencia no estado nutricional do adolescentes tanto no estado do Pará ($p=0,43$) como a nível de Brasil ($p=0,3$). No Pará e no Brasil há predominância de pacientes eutróficos, sendo que estes correspondem a mais de 2/3 do total de adolescentes avaliados, entretanto houve discreta discordância entre os gêneros no que diz respeito as classificações de baixo do peso para idade, com maior incidência de sobrepeso entre as mulheres, e maior incidência de baixo peso pra idade entre os homens. Conclusão: A maioria dos adolescentes usuários da Atenção Básica são do gênero feminino. O Pará e o Brasil apresentam perfil nutricional similar neste estudo, com prevalência de adolescentes eutróficos, porém há maior incidência de sobrepeso entre as mulheres, e maior incidência de baixo peso entre os homens.