



Trabalhos Científicos

Título: Avaliação Dos Casos De Desmame Precoce E As Principais Condutas Alimentares Adotadas Pelas Mães De Crianças Atendidas No Ambulatório De Puericultura

Autores: BEATRIZ GARCIA LAMEIRA (CESUPA); HAISSA ASSAD DOS SANTOS GERALDO (CESUPA); BIANCA AZEVEDO PARREIRA MARTINS (CESUPA)

Resumo: OBJETIVO: O presente trabalho tem por finalidade identificar as idades pediátricas onde há prevalência do desmame precoce, da inserção de alimentos à retirada total do leite materno, além dos principais erros alimentares cometidos pelas mães na complementação nutricional. MÉTODO: Trata-se de um estudo epidemiológico transversal e retrospectivo onde foram coletados dados de 37 prontuários de pacientes atendidos no ambulatório de Puericultura, do período de 1 de janeiro de 2015 à 30 de junho de 2016. Foram agrupados os casos de desmame precoce e separadas as idades prevalentes e os principais alimentos complementares administrados. RESULTADO: Do total analisado 67,6% (25/37) das crianças não mamou exclusivamente até os 6 meses de vida. Dos quais 16% (4/25) não mamou, 4% (1/25) mamou até o primeiro mês, 12% (3/25) mamou até o segundo mês, 12% (3/25) mamou até o terceiro mês, 32% (8/25) mamou até o quarto mês e 24% (6/25) mamou até o quinto mês de vida. Dentre esses, o leite materno foi substituído erroneamente em 68% dos casos (17/25) por leite de vaca, 48% (12/25) por alimentos ricos em glúten, 56% (14/25) por papas, 16% (4/25) optaram por fórmulas infantis e 20% (5/25) administrou suplementação vitamínica, todas antes dos 6 meses. CONCLUSÃO: É de suma importância a informação às mães da importância do leite materno para a criança, além da orientação pediátrica e nutróloga das que fazem alimentação complementar erroneamente.