



21 A 23 DE MARÇO
DE 2024
TEATRO FACISA
CAMPINA GRANDE - PB



Trabalhos Científicos

Título: Perfil De Morbidade Hospitalar Por Linfoma De Hodgkin Em Pacientes Pediátricos Na Região Nordeste, De 2013 A 2023.

Autores: LARISSA DE PONTES COSTA ABREU (UFCG), ARTHUR NÓBREGA RODRIGUES DE LIMA (UFCG), ANA VITÓRIA ROMUALDO DE FRANÇA (UFCG), ANA LUZIA SÁ DE MELO (UFCG), BRUNO VARELA FERNANDES (UFCG), HENRIQUE FIALHO CARNEIRO BRAGA COSTA (UFCG), LETÍCIA BEZERRA DE ALMEIDA (UFCG), LUCAS BRITO MARACAJÁ (UFCG)

Resumo: O Linfoma de Hodgkin (LH) é uma neoplasia que se origina a partir de linfócitos, resultando no crescimento anormal de tecidos linfóides. Devido o seu caráter insidioso e à especificidade deste tipo de neoplasia dentro do espectro dos linfomas, faz-se fundamental a avaliação epidemiológica na população pediátrica para o desenvolvimento de estratégias de detecção precoce e, consequentemente, de melhorias no prognóstico e na qualidade de vida desses pacientes. "Analisar o perfil epidemiológico da morbidade por linfoma de Hodgkin em pacientes entre 0 e 19 anos no Nordeste em um período de dez anos." Trata-se de um estudo transversal observacional descritivo acerca da Morbidade Hospitalar por local de internação, do ano de 2013 a 2023, em faixa etária entre 0 e 19 anos na região Nordeste. Os dados foram coletados no DATASUS e foram incluídas as variáveis: sexo, região, raça, número de internações, número de óbitos e faixa etária. " Os dados analisados indicaram que ocorreram 5.021 internações de pacientes com idades entre 0 a 19 anos por LH na região Nordeste entre janeiro de 2013 e novembro de 2023, o que corresponde a 32% do total de internações por essa doença nessa faixa etária no Brasil. Quando analisado separadamente, o estado que apresentou o número mais expressivo foi Pernambuco com 1.769 de internações, representando 35% do total da região Nordeste. A média de internações por ano foi 418, sendo 2019 o ano com o maior número, totalizando 592. A predominância foi do sexo masculino (59,3%) e da faixa etária de 15 a 19 anos (50,6%). A faixa etária menor que 1 ano foi a que apresentou o menor número de internações (n = 19), sendo também a única em que o sexo feminino prevaleceu sobre o masculino (63,1%). Com relação ao número de óbitos, o total foi de 71, dos quais predominaram o sexo masculino (61,9%) e a faixa etária de 15 a 19 anos (46,4%). Quanto à cor/raça, observou-se a predominância da cor/raça parda tanto nas internações (67,7%), quanto nos óbitos (67,7%). Por fim, no que tange ao caráter de atendimento, o de urgência prevaleceu sobre o eletivo, caracterizando 54% do total (n = 2.724)." A análise das internações por LH na população pediátrica do Nordeste do Brasil destaca uma concentração de casos em adolescentes de 15 a 19 anos, especialmente do sexo masculino e na cor/raça parda, indo ao encontro dos achados na literatura. Sendo uma neoplasia potencialmente curável, o LH necessita de um diagnóstico precoce, no entanto, a prevalência de atendimentos de urgência sugere possíveis atrasos no diagnóstico e no acesso ao tratamento. Fatores como disparidades socioeconômicas, acesso desigual aos serviços de saúde e variáveis ambientais e genéticas influenciam esses padrões. Esses resultados apontam para a necessidade de estratégias direcionadas de saúde pública para melhorar o diagnóstico precoce, o tratamento e reduzir as desigualdades de saúde nesta população vulnerável. _x000D_ _x000D_