



21 A 23 DE MARÇO
DE 2024
TEATRO FACISA
CAMPINA GRANDE - PB



Trabalhos Científicos

Título: Diagnóstico E Tratamento Da Colelitíase Na Pediatria: Uma Revisão Sistemática

Autores: ALTEMAR FERREIRA DE ANDRADE JÚNIOR (FACULDADE NOVA ESPERANÇA), CAMILA BERNARDO DO LAVOR (FACULDADE NOVA ESPERANÇA), FRANCISCO LEOPOLDO MARTINS NETO (FACULDADE NOVA ESPERANÇA), HELDER RAFAEL NUNES VIEIRA (FACULDADE NOVA ESPERANÇA), KAIO ASSIS ALCÂNTARA FREITAS (FACULDADE NOVA ESPERANÇA), KAMYLA MILENE ALCÂNTARA FREITAS (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA), LUIS AUGUSTO MARTINS PALMEIRAS LIMA LUGO (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA), NATHÁLIA QUEIROZ GALDINO MANGUEIRA (FACULDADE NOVA ESPERANÇA), STEPHANIE DE SOUZA FARIAS (FACULDADE NOVA ESPERANÇA), FRANCISCO DE ASSIS FREITAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA)

Resumo: Estima-se que aproximadamente 20% dos casos de colelitíase se manifestam de forma assintomática, sendo que a maioria dos lactentes e crianças apresentam sintomas como vômitos e dores abdominais atípicas. A colelitíase é uma condição marcada pelo acúmulo de cálculos na vesícula, podendo assumir diversas formas. Diante desse cenário, é crucial aprofundar sobre o conhecimento do diagnóstico e tratamento da colelitíase na população pediátrica. "Revisar a literatura vigente acerca do diagnóstico e tratamento da colelitíase na pediatria" Foi realizada uma revisão sistemática. Foram utilizadas como fonte de busca: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os descritores utilizados estão presentes no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e foram "Colelitíase", "Vesícula Biliar" e "Pediatria" combinadas com o operador booleano "AND". Foram incluídos artigos em português, sendo selecionados pelos últimos cinco anos disponíveis na íntegra de forma gratuita e excluídos artigos sem relação com o tema. "A cólica biliar, caracterizada por dor abdominal no quadrante superior direito ou epigástrico, pode irradiar para o ombro direito, acompanhada de náuseas e vômitos após alimentos gordurosos. A recorrência das crises é irregular, com alta probabilidade após a primeira. Os sintomas atípicos incluem regurgitação, queimação epigástrica, distensão abdominal, plenitude gástrica, eructação e dor abdominal inespecífica. Manifestações agudas são menos comuns em crianças (5-10%), sendo a ultrassonografia abdominal o método mais preciso (98%) para diagnóstico de cálculos biliares. Quanto ao tratamento, a colecistectomia laparoscópica é consensual, indicada precocemente para casos sintomáticos, evitando complicações emergenciais (16% de taxa de complicação), enquanto os assintomáticos não realizam intervenção precoce devido à baixa probabilidade de complicações." Esse estudo mostrou que a colelitíase pediátrica emerge como uma condição de relevância na prática médica. A atenção dedicada a uma investigação minuciosa dos sintomas, aliada a um diagnóstico e tratamento precoce, pode resultar em uma probabilidade reduzida de complicações para os pacientes afetados por essa patologia.