



04 a 07
DE JUNHO

Hotel Girassol Plaza
T01 Norte, Rua NS A, Conj. 2, Lote 4
Plano Diretor Norte, Palmas - TO



Trabalhos Científicos

Título: Perfil Clínico E Fatores De Risco Em Pacientes Pediátricos Com Intussuscepção

Autores: LUANA FERREIRA DIAS DA SILVA (UNITPAC), SARHA REBECA PERES RORIZ (UNITPAC), SAMARA FERREIRA COSTA (UNITPAC), BRUNNA MARCELA NUNES LEAL (UNITPAC), LUCAS VINICIUS ALVES SANTOS (UNITPAC), HANNE KAROLINE LOPES OLIVEIRA (UNITPAC), ISABELLA MORELLI LOPES GRATÃO (UNITPAC), DADJA MARIA OLIVEIRA DA PAZ FONTES (UNITPAC), CRISTIANE NUNES ASSIS (UNITPAC)

Resumo: A intussuscepção é uma condição médica observada frequentemente na população pediátrica, principalmente em lactentes menores de dois anos. Esta condição é caracterizada pela invaginação de um segmento intestinal dentro de outro, podendo levar a diversas complicações críticas, como obstrução intestinal e isquemia. A apresentação clínica desta patologia pode ser variada embora seja descrita a tríade clássica de sintomas com dor abdominal em cólica, fezes com aspecto de 'geleia de framboesa' e massa abdominal palpável, não se prende apenas a essa sintomatologia dificultando o diagnóstico precoce. É essencial a identificação dos fatores de risco e do perfil clínico dos pacientes para uma abordagem rápida e eficaz. "Analisar o perfil clínico e os fatores de risco associados à intussuscepção em pacientes pediátricos, e apresentar abordagens diagnósticas e terapêuticas existentes no manejo da condição." Trata-se de uma revisão integrativa da literatura guiada pela pergunta norteadora: Qual o Perfil Clínico e Fatores de Risco em Pacientes Pediátricos com intussuscepção? Para tanto, foram utilizadas as plataformas PubMed e Scielo para buscas de estudos publicados nos últimos 5 anos. A pesquisa foi feita em outubro de 2024, incluindo os idiomas português e inglês, sendo encontrados 2 artigos no PubMed e 3 artigos no Scielo. Foram excluídos materiais que não correlacionaram com o objetivo do estudo, bem como relatos de caso, com base em requisitos pré-estabelecidos, foram selecionados cinco estudos de destaque para compor esta revisão. "A intussuscepção é mais prevalente em lactentes, especialmente na faixa etária de 6 a 12 meses, com um pico de incidência observado aos 9 meses. Uma condição que afeta predominantemente o sexo masculino, com uma razão de aproximadamente 2:1 em relação às meninas. Em termos de raça, não foram observadas diferenças significativas na incidência da intussuscepção entre grupos raciais, embora a maioria dos casos tenha sido relacionada em crianças de raça branca. Esses dados ressaltam a necessidade de vigilância especial em lactentes do sexo masculino, especialmente aquelas dentro da faixa etária mais suscetível. "A compreensão do perfil clínico e dos fatores de risco associados à intussuscepção em pacientes pediátricos é crucial para a identificação precoce e o manejo eficaz da condição. Conhecer as características demográficas, como idade e sexo, permite que os profissionais de saúde implementem estratégias de triagem mais direcionadas, melhorando os resultados clínicos e as consequências associadas.