



2º DERMAPED

SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE
DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA

11 a 13 de Abril de 2018
Curitiba - Paraná

Trabalhos Científicos

Título: Lesões No Tronco Do Recém-Nascido – Quais Necessitam De Tratamento?

Autores: DANIELLE ARAKE ZANATTA (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); VÂNIA OLIVEIRA DE CARVALHO (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); IWYNA FRANÇA SOUZA GOMES VIAL (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); NARA FROTA ANDRÉ (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); MARIANA CANATO (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ)

Resumo: Objetivo: Apresentar diagnósticos diferenciais de dermatoses neonatais de maneira interativa com os congressistas. Método: Apresentação de pôster com imagens de dermatoses localizadas no tronco de recém-nascidos (RN) cujo diagnóstico é realizado pelas características clínicas das lesões, associado a uma breve descrição da história. Os diagnósticos permanecerão ocultos e os participantes serão convidados a opinar sobre o diagnóstico. Resultados: Melanose Pustulosa Neonatal Benigna – presente ao nascimento, apresenta-se com vesicopústulas, colarete de descamação e máculas hipercrômicas pós inflamatórias, que resolvem após alguns meses. As pústulas são estéreis, compostas por neutrófilos. Eritema Tóxico Neonatal – afeta RN a termo nas primeiras 48 horas de vida e duram até uma semana. Caracterizada por erupção de pápulas eritematosas ou pústulas com eritema circundante em qualquer parte do corpo, poupando palmas e plantas. As pústulas são estéreis, compostas por eosinófilos. Impetigo Bolhoso – inicia nas 2 primeiras semanas de vida com bolhas de base eritematosa e conteúdo claro, flácidas, que rompem deixando colarete de descamação e área de pele desnuda central e resolvem sem cicatriz. Bacterioscopia e cultura identificam a bactéria. Conforme a extensão é indicado antibiótico via oral ou endovenoso. Candidíase Congênita Neonatal – presente ao nascimento ou primeiros dias de vida, caracterizada por pápulas eritematosas e pústulas com descamação, localizada ou disseminada. O micológico direto e cultura da lesão confirmam o diagnóstico. A prematuridade é fator de risco e o tratamento é com antifúngico endovenoso. Herpes Neonatal – ocorre entre o 5º e 14º dias de vida, caracterizado por vesicopústulas, crostas e exulcerações em qualquer localização, inclusive mucosas. Letargia e irritabilidade estão presentes. A reação em cadeia de polimerase ou cultura viral de secreções, sangue ou líquido auxiliam no diagnóstico. É tratado com antiviral endovenoso. Conclusão: O exame clínico da pele para reconhecimento das dermatoses neonatais associado a história clínica são fundamentais para o diagnóstico e tratamento adequado.