



Trabalhos Científicos

Título: Relato De Caso: Condiloma Acuminado Na Infância Tratado Com Imiquimode Tópico

Autores: BRUNA LUIZA GUERRER (HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL - HRMS); ADRIANA PRAZERES DA SILVA (HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL - HRMS)

Resumo: Introdução: As verrugas genitais, incluindo o condiloma acuminado, podem ser observadas durante a infância e têm prevalência pouco estabelecida. É importante definir o modo de transmissão, o tratamento e o seguimento devido às potenciais complicações a longo prazo. Embora as verrugas genitais possam se resolver espontaneamente, o tratamento de formas extensas em crianças é um desafio. Descrição do caso: L.F.A.T, 5 anos, admitido com múltiplas lesões vegetantes em região perianal, de surgimento há 3 meses e sem tratamento prévio. Mãe relatou suspeita de abuso sexual por parte do vizinho adolescente. Ao exame físico: inúmeras pápulas hiperkeratóticas amarronzadas em região perianal. Diante da hipótese diagnóstica de condiloma acuminado foi iniciado tratamento com imiquimode 5 creme, 1 sachê à noite, 3 vezes por semana, sendo mantido até remissão completa das lesões (5 meses). Discussão: Lesões decorrentes da infecção pelo papilomavírus humano (HPV) na infância, em especial as verrugas genitais, devem servir de alerta para a possibilidade de abuso sexual. Os principais locais acometidos são as extremidades e a face, sendo a localização anogenital menos comum. O tratamento das lesões condilomatosas extensas na infância é um desafio terapêutico. Os procedimentos ablativos e as cirurgias a laser são muito dolorosos. O imiquimode tópico a 5 vem sendo utilizado para o tratamento de condiloma acuminado em adultos com sucesso. Embora não aprovado para a população pediátrica, pode ser uma escolha para casos que não respondem ao tratamento convencional. O Imiquimode não possui ação antiviral direta. A sua eficácia passa por dois mecanismos: a apoptose de queratinócitos infectados e a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Eritema, ardor e prurido são efeitos colaterais comuns, sendo raros os relatos de erosões ou ulcerações. Conclusão: O trabalho tem por objetivo relatar o caso de uma criança com condiloma acuminado perianal destacando a boa resposta ao tratamento tópico com imiquimode.