



## Trabalhos Científicos

**Título:** Apresentação Atípica De Líquen Estriado - Padrão Não-Linear

**Autores:** FERNANDA TARUHN ROMANI (UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL); JENIFER DE MORAIS SILVA (UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL); JESSICA MINETTO FRANCO (UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL); JOANA MARCHET DALOSTO (UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL); ROBERTA CASTILHOS DA SILVA (UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL)

**Resumo:** INTRODUÇÃO O líquen estriado (LE) é uma dermatose inflamatória benigna e autolimitada. Trata-se de uma patologia que tipicamente acomete crianças, especialmente meninas, com idade entre três e quinze anos. As lesões normalmente apresentam padrão linear, sendo rara a apresentação não linear. DESCRIÇÃO DO CASO Paciente feminina, 9 anos, em acompanhamento por quadro de dermatite atópica moderada. Há aproximadamente dois meses, mãe notou surgimento de lesão no abdome, pouco pruriginosa, que inicialmente apresentava-se como placa eritematosa e descamativa, progredindo com surgimento de pápulas normocrômicas coalescentes em disposição algo circular, unilateral. O exame anatomopatológico demonstrou dermatite de interface liquenoide com hiperqueratose, acantose discreta da epiderme e infiltrado linfo-histiocitário liquenoide no derma papilar com extensão profunda em torno dos vasos, perifolicular e no aparato écrino, compatível com LE. A paciente apresentou boa resposta ao tratamento com corticoide e imunomodulador tópicos. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO A etiologia do LE é desconhecida. Observa-se uma variação na ocorrência do LE com a estação do ano, aumentando na primavera e no verão, associando esse fato com a ocorrência de doenças virais. Porém, outros fatores também são propostos como desencadeantes: traumas, vacinas, medicamentos, gravidez e atopia. As lesões caracterizam-se por pápulas eritematosas, que ocorrem coincidentes com vesículas, geralmente solitárias e com configuração linear ao longo das linhas de Blaschko. Tipicamente é assintomática, mas há relatos de prurido, especialmente em pacientes com dermatite atópica. O diagnóstico diferencial de LE pode incluir diferentes erupções papulares lineares. O tratamento padrão para LE é geralmente apenas observação, tendo em vista seu curso benigno e autolimitado. Apesar disso, os pacientes que usam corticoides de baixa e média potência e imunomoduladores tópicos tendem a ter uma duração menor da dermatose.